Cuadro Sinoptico

Nombre del alumno: Paulo Fernando Navarro Aguilar

Materia: Enfermería Clínica I

Nombre del profesor: María del Carmen López Silva

Nombre del tema: Shock.

Licenciatura: Lic. En enfermería.

Cuatrimestre: 4

SHOCK

ETIOLOGIA

- El shock puede ser ocasionado por cualquier afección que reduzca el flujo de sangre
- provoca desmayos, probablemente al iniciar la dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan los músculos

Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente.

CLASIFICACION

- Shock Hemorrágico
  - s un shock hipovolémico caracterizado por una pérdida extravascular de sangre, importante y rápida
- Shock Hipovolémico no hemorrágico
  - Puede presentarse un inadecuado volumen sanguíneo circulante por la pérdida de fluidos del compartimiento intravascular
- Shock cardiogénico
  - ocurre cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre y oxígeno al cerebro y otros órganos vitales
- Shock obstructivo extra cardiaco
  - causado por algo fuera del corazón que evita que el corazón bombee suficiente sangre
- Shock Séptico
  - Infección generalizada que ocasiona insuficiencia orgánica y caída de la presión sanguínea a niveles peligrosos.
- Shock Anafiláctico
  - Reacción alérgica aguda y potencialmente mortal.
- Shock Neurogénico
  - es causado por daño al sistema nervioso

CUIDADOS

- Soporte Respiratorio
  - Al igual que en otras situaciones críticas la prioridad inicial en el shock es asegurar una correcta función respiratoria
- Soporte Circulatorio
  - Una vez asegurada la función respiratoria hay que establecer un acceso venoso para la administración de fluidos y fármacos
- Reposición de la volemia
  - Independientemente de la causa del shock, y si no existen signos de sobrecarga de volumen, es imprescindible restaurar el volumen circulante