



UDS CAMPUS COMITAN

(LICENCIATURA EN ENFERMERÍA)

TRABAJO: “MAPA CONCEPTUAL”

TEMA: PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA

ASIGNATURA: : ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

CATEDRÁTICO:

MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

NOMBRE DEL ALUMNO:

MERCEDES JAQUELINE CRUZ SANTIAGO

GRADO: 4° B

COMITAN DE DOMINGUEZ CHIAPAS

"PREECLAMPSIA"

PREECLAMPSIA

(EXCESO DE PROTEINA EN LA ORINA).

Es una afección médica seria que puede ocasionar un parto prematuro y la muerte.

**ALGUNAS TIENEN MAYOR RIESGO.
LOS FACTORES DE RIESGO INCLUYEN:**

PRIMER EMBARAZO (PREECLAMPSIA EN UN EMBARAZO PREVIO).

Afecciones existentes como presión arterial alta, diabetes, enfermedad renal y lupus eritematoso sistémico, tener 35 años de edad o más, tener un embarazo de dos o más fetos y obesidad.

La preeclampsia, por lo general, comienza luego de las 20 semanas de embarazo en mujeres cuya presión arterial ha estado dentro de los valores normales hasta entonces.

SINTOMAS

- La presión arterial alta
- Exceso de proteínas en la orina (proteinuria).
- Niveles más bajos de plaquetas en la sangre (trombocitopenia)
- Aumento de las enzimas hepáticas, que indican problemas en el hígado
- Dolores de cabeza intensos
- Falta de aire, debido a la presencia de líquido en los pulmones
- Dolor en la parte superior del abdomen, por lo general debajo de las costillas del lado derecho
- Náuseas o vómitos.
- ETC.

FACTORES DE RIESGO

SEVEROS:

HTA, ANTECEDENTES DE PREECLAMPSIA, DIABETES MELLITUS, ALCOHOLISMO, DROGAS.

MODERADOS: MALA ALIMENTACIÓN, ESTILO DE VIDA.

CAUSAS

Los especialistas creen que comienza en la placenta, el órgano que nutre al feto durante el embarazo. En las primeras semanas del embarazo, se forman nuevos vasos sanguíneos y estos evolucionan para suministrar oxígeno y nutrientes a la placenta.

Cuando una mujer tiene preeclampsia, estos vasos sanguíneos no parecen desarrollarse o funcionar correctamente.

Los problemas de circulación de la sangre en la placenta pueden provocar que la presión arterial en la madre no se regule correctamente.

LA HIPERTENSIÓN GESTACIONAL

presión arterial alta que comienza después de la semana 20 sin causar problemas en los riñones u otros órganos. Algunas mujeres con hipertensión gestacional pueden padecer preeclampsia.

HIPERTENSIÓN CRÓNICA

presión arterial alta que estaba presente antes del embarazo o que aparece antes de la semana 20 de embarazo. La presión arterial alta que continúa durante más de tres meses después del embarazo también se denomina "hipertensión crónica".

PRE-ECLAMPSIA Hace referencia a la presencia de cifras tensionales mayores o iguales a 140/90mmhg, proteinuria mayor a 300mg/24h, Creatinina Sérica elevada (>30 mg/mmol), en la gestante con embarazo mayor a 20 semanas o hasta dos semanas posparto.

Los IECA, ARA-II y los inhibidores de la renina están contraindicados.

TRATAMIENTO DE LA HTA: ARA II + DIURETICO

ECLAMPSIA

ECLAMPSIA

La eclampsia son convulsiones que se producen en las mujeres con preeclampsia y que no tienen otra causa.



TRATAMIENTO

- Anticonvulsivantes, como el sulfato de magnesio, el lorazepam o el diazepam.
- Antihipertensivos, como el labetalol o la hidralazina, para bajar la presión sanguínea.
- Programación del parto lo antes posible, ya que el riesgo de convulsiones disminuye después del nacimiento del bebé.

¿COMO SE MANIFIESTA LA ECLAMPSIA?

La preeclampsia es una afección que se caracteriza por presión arterial alta y proteinuria (proteínas en la orina) después de las 20 semanas de gestación.

CAUSAS

Aunque no se conoce el mecanismo último de las convulsiones, se piensa que son una respuesta del cerebro (por falta de riego y por hinchazón) al aumento de la tensión arterial de la madre.

LA ECLAMPSIA SE CONSIDERA GRAVE SI APARECEN 1 O MÁS DE LOS SIGUIENTES SIGNOS:

- Coma de más de 6 horas de duración.
- Fiebre mayor de 39°C.
- Pulsaciones mayores de 120/minuto.
- Tensión arterial sistólica (la alta) superior a 200 mmHg.
- Frecuencia respiratoria mayor de 40/minuto.
- Más de 10 convulsiones

POSIBLES

COMPLICACIONES

Las mujeres con eclampsia o preeclampsia tienen un riesgo mayor de:

- Separación de la placenta (desprendimiento prematuro de placenta)
- Parto prematuro que lleva a complicaciones en el bebé
- Problemas de coagulación de la sangre
- Accidente cerebrovascular
- Muerte del bebé
- Muerte materna

SINTOMAS

- Convulsiones
- Agitación intensa
- Pérdida del conocimiento
- Estado mental alterado y confusión

La eclampsia se presenta después de la preeclampsia, pero la mayoría de las mujeres con preeclampsia no tienen eclampsia.

La eclampsia se manifiesta como convulsiones generalizadas tónico-clónicas, que no están relacionadas con afecciones neurológicas.

Primeros Síntomas de Eclampsia: Acude a un hospital a emergencias



Dolor de Cabeza

Dolor abdominal

Alteración mental

Náuseas y vómito



Síntomas de Gravedad:

Convulsiones



LOS TIPOS DE ECLAMPSIA SON:

- **Eclampsia anteparto temprana:** se da antes de las 28 semana de gestación.
- **Eclampsia anteparto:** se presenta después de la 28 semana de gestación.
- **Eclampsia intraparto:** aparece durante el parto.
- **Eclampsia postparto precoz:** aparece en las 48 horas siguientes al parto.
- **Eclampsia postparto tardía:** se da pasadas más de 48 horas del parto.

BIBLIOGRAFÍA:

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/48e1a678fd9ede0ac40b7a71bc1a7444-LC-LEN405%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DE%20LA%20MUJER.pdf>

(S/f-c). Com.mx. Recuperado el 9 de octubre de 2024, de

[https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/48e1a678fd9ede0ac40b7a71bc1a7444-LC-](https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/48e1a678fd9ede0ac40b7a71bc1a7444-LC-LEN405%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DE%20LA%20MUJER.pdf)

[LEN405%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DE%20LA%20MUJER.pdf](https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/48e1a678fd9ede0ac40b7a71bc1a7444-LC-LEN405%20ENFERMERIA%20EN%20EL%20CUIDADO%20DE%20LA%20MUJER.pdf)

https://salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/PREECLAMPSIA_ECLAMPSIA_lin-2007.pdf

(S/f-d). Gob.mx. Recuperado el 9 de octubre de 2024, de

https://salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/PREECLAMPSIA_ECLAMPSIA_lin-2007.pdf.

INFORMACIÓN SACADA DE LA LIBRETA (CLASE SÁBADO).