



NOMBRE DEL ALUMNO: ERICK GABRIEL AGUILAR MEZA

NOMBRE DEL TEMA: MAPA CONCEPTUAL
"PREECLAMPSIA, ECLAMPSIA"

PARCIAL: 1 PERCIAL

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA EN EL CUIDADO
DE LA MUJER

NOMBRE DEL PROFESOR: MARCOS JHODANYARGUELLO
GALVEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 4 TO

Preeclampsia- Eclampsia

Preeclampsia.

Es la hipertensión de reciente comienzo con proteinuria después de las 20 semanas de gestación.

Diagnóstico

- Hipertensión de reciente comienzo (tensión arterial $>140/90$ mmHg) más proteinuria inexplicable >300 mg/24h después de las 20 semanas.
- En ausencia de proteinuria, la preeclampsia también se diagnostica si tienen hipertensión con aparición de cualquiera de los siguientes:
 1. Trombocitopenia (plaquetas $< 100.000/\mu\text{L}$)
 2. Insuficiencia renal (creatinina sérica $> 1,1$ mg/dL o duplicación de la creatinina en suero en mujeres sin enfermedad renal)
 3. Deterioro de la función hepática (transaminasas > 2 veces el valor normal)
 4. Edema pulmonar.

Tratamiento Médico

- Antihipertensivos:
 Nifedipina: administrar 10 mg por vía sublingual.
En caso de no contar con nifedipina, administrar los dos siguientes antihipertensivos:
 Alfa metil dopa: 500 mg. VO cada 6 horas
 Hidralazina: 50 mg. VO cada 6 horas
 Dexametasona: 16 mg. IV. Dosis única. En cada necesario continuar 8 mg. IV. Cada 8 horas, es indicado para evitar edema cerebral
 Fenobarbital: Aplicas una ampolleta (0.333 gr.) IM cada 12 horas para prevenir crisis convulsivas

Eclampsia.

Es la presencia de convulsiones generalizadas inexplicables en pacientes con preeclampsia.

Tratamiento nutricional

- Dieta Normosódica
- Hierro, ácido fólico y calcio
- Omega 3
- Zinc y suplementos de magnesio
- Suplementos de antioxidantes como vitamina C y E