

UNIVERSIDAD UDS

ALUMNA: Estrella Guadalupe Loya Gordillo

PROFESOR: Marcos Jhodani Arguello Gálvez

MATERIA: Enf. En Cuidados De La Mujer.

GRADO: 4to cuatrimestre

GRUPO: B



# Preeclampsia Y Eclampsia




es una complicación del embarazo que se caracteriza por presión arterial alta y signos de daño en los órganos, como niveles elevados de proteína en la orina.

Suele aparecer después de la semana 20 de embarazo, pero en casos poco frecuentes puede presentarse después del parto, lo que se conoce como preeclampsia posparto.

La preeclampsia puede tener consecuencias graves para la madre y el bebé, por lo que es importante tratarla lo antes posible. Si no se trata, puede provocar convulsiones peligrosas (eclampsia) y ser mortal.


Los síntomas de la preeclampsia incluyen:

- Presión arterial alta
- Proteinuria
- Dolor de cabeza
- Visión borrosa
- Dolor en la parte superior derecha del abdomen
- Hinchazón en la cara y las manos



Para tratar la preeclampsia, se controla la presión arterial y se administran medicamentos. El momento ideal para el parto depende de la gravedad de la preeclampsia y de la semana de embarazo

Para prevenir la eclampsia, es importante controlar la tensión arterial, el peso y la función renal durante el embarazo



La eclampsia es una complicación grave y potencialmente mortal del embarazo que se caracteriza por la aparición de convulsiones en mujeres que ya han tenido preeclampsia.

La preeclampsia es una afección que se caracteriza por presión arterial alta y daño a órganos como los riñones o el hígado.

La eclampsia puede ocurrir antes, durante o después del parto. Es más frecuente en mujeres primíparas que en multiparas.

La eclampsia puede causar:

- Lesiones cerebrales
- Problemas respiratorios
- Problemas cardíacos
- Insuficiencia renal
- Daño hepático
- Restricción del crecimiento del feto
- Parto prematuro
- Sufrimiento e incluso muerte fetal