



Mi Universidad

Nombre del Alumno: *Erandy Natali Alfaro Hernández*

Nombre del tema: *cuadro sinóptico*

Parcial:

Cuadro sinóptico

Nombre de la Materia: *Enfermería en el cuidado de la mujer*

Nombre del profesor: *Marcos Jhovany Arguello Gálvez*

Nombre de la Licenciatura:

Enfermería

Cuatrimestre: *Cuarto*

Lugar y Fecha de elaboración: *Comitán de Domínguez, Chiapas 14 de octubre de 2024*

PREECLAMPSIA

CONCEPTO

presión arterial alta con valores ≥ 140 mmHg sistólica y ≥ 90 mmHg en diastólica. En embarazadas de 20sdg hasta las 12 semanas posparto.

FACTORES DE RIESGO

- | Severos | Moderados |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Hipertensión arterial sistémica• Antecedentes de preeclampsia• Alcoholismo• Drogas• DM1, DM2. | <ul style="list-style-type: none">• Mala alimentación• estilo de vida (modificables) |


PREECLAMPSIA CON DATOS DE SEVERIDAD

- criterios de severidad**
- ≥ 160 mmHg sistólica
 - ≥ 110 mmHg diastólica
 - **Falla orgánica múltiple.**

DAÑO ENDOTELIAL

- Disminución de las células de trofoblasto
 - Disminución de VEG(angiogenesis) crea vasos sanguíneos
 - disminuye flujo sanguíneo.
 - disminuye la resistencia periférica
 - isquemia tisular
 - daño endotelial
 - vaso espasmos
 - hisquemia hepática
 - hisquemia renal
 - aumento de la permeabilidad edema
- PROVOCA**

ISQUEMIA RENAL



ECLAMPSIA

COMBULSIONES A CONSECUENCIA DE LA PREECLAMPSIA → PROTEGEMOS CABEZA, LENGUA Y PRODUCTO

