



SUPERNOTA

NOMBRE DEL ALUMNO: CATARINA JIMÉNEZ LÓPEZ

NOMBRE DEL TEMA: MANEJO DEL INDICADOR DE SODA DE FOLEY
INSTALADO

PARCIAL: 1

NOMBRE DE LA MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA 11

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA DEL CAMEN LOPEZ SILVA

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: LIC. EN ENFERMERÍA

CUATRIMESTRE: SEPTIMO CUATRIMESTRE C

MANEJO DEL INDICADOR DE SONDA DE FOLEY INSTALADA

SONDA FOLEY

Para M: 14-16 Fr y H:18,-22 Fr

Indicada para:
lavado de drenaje vesical, producir hemostasis en hemorragias vesicales, evitar contacto con la orina con lesión perineal o escara sacra, facilitar medición exacta de la orina, evacuar orina en problemas obstructivos, prevenir complicaciones vesicales en cirugía pélvica

CONTRAINDICADA

Prostatitis aguda, uretritis aguda, abscesos periuretrales, sospecha de rotura uretral traumática, alergias conocidas al látex.
Valoración previa a pacientes:
edad, historia clínica, capacidad para cooperar, características de la zona perineal, y genital de globo vesical.

CUIDADOS EN INSTALACION

Aseo genital previo, mantener técnica aséptica, tener todo el material reunido al comienzo de la instalación y contar con asistente, verificar cuff insuflando de 5 a 5cc de aire antes de introducir la sonda, lubricar el extremo distal de la sonda, no forzar la entrada de la sonda para no producir trauma.

Introducir suavemente la sonda mientras el paciente inspira profundo, una vez que haya fluído la orina introducir 3 cm mas e inflar cuff, registrar incidentes: numero de intentos, cantidad y característica de orina.

MANEJO POSTERIOS

Mantener circuito estéril.
Calcular la zona de fijación de forma tal que no quede tirante, cambiar sitio de fijación.
Verificar permeabilidad de la sonda.
Girar la sonda para evitar adherencia al menos una vez por turno.
Mantener la bolsa recolectora bajo el nivel del tórax para evitar reflujo.

Si se debe clampear hacerlo de la zona mas proximal del tubo de drenaje, no de la sonda misma.
Realizar aseo genital al menos una vez por turno y según la necesidad del paciente.
Atentos a síntomas de infecciones.
Al vaciar bolsa recolectora cuidar de contaminar.
Para muestra de orina se obtiene por segundo lumen de la sonda no por la bolsa recolectora.

COMPLICACIONES

Durante la colocación o uso de una sonda Foley pueden surgir diversas complicaciones. Algunas de las más comunes incluyen infecciones del tracto urinario, lesiones en la uretra o vejiga, sangrado, obstrucción de la sonda y retención urinaria.

