



Mi Universidad

Nombre del Alumno: *keren Merari Hernández Hernández*

Nombre del tema:

Cuestionarios de:

- Impronta parental*
- Segmentación del cigoto*
- Transporte e implantación del embrión*
- fecundación*

Parcial: *2do*

Nombre de la Materia: *biología del desarrollo*

Nombre del profesor: *DR. Guillermo del solar Villareal*

Nombre de la Licenciatura: *medicina humana*

Semestre: *1 A*

Cuestionario impronta parental

1. ¿Qué es la impronta parental?

- a) Un fenómeno epigenético en el que la expresión de un gen depende del sexo del progenitor que lo ha transmitido.
- b) Un fenómeno epigenético en el que la expresión de un gen depende del sexo del cigoto.
- c) Un fenómeno genético en el que la expresión de un gen depende del sexo del progenitor que lo ha transmitido.
- d) Un fenómeno genético en el que la expresión de un gen depende del sexo del cigoto.

2. ¿Qué es el cigoto?

- a) La célula resultante de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide.
- b) La célula resultante de la división del cigoto.
- c) La célula resultante de la implantación del cigoto en el útero.
- d) La célula resultante de la expresión de los genes improntados parentalmente.

3. ¿Qué es la segmentación?

- a) El proceso por el que el cigoto se divide en células más pequeñas.
- b) El proceso por el que el cigoto se implanta en el útero.
- c) El proceso por el que los genes improntados parentalmente se activan.
- d) El proceso por el que los genes improntados parentalmente se desactivan.

4. ¿Cuál es la función de la impronta parental en la segmentación?

- a) Regula la expresión de los genes improntados parentalmente.
- b) Garantiza que el cigoto se divida de forma uniforme.
- c) Permite que el cigoto se mueva a través de la trompa de Falopio.
- d) Permite que el cigoto se implante en el útero.

5. ¿Cuál es el ejemplo de impronta parental en la segmentación?

- a) El gen Peg1, que está activo en las células del cigoto que proceden del espermatozoide.
- b) El gen Peg1, que está activo en las células del cigoto que proceden del óvulo.
- c) El gen Peg2, que está activo en las células del cigoto que proceden del espermatozoide.
- d) El gen Peg2, que está activo en las células del cigoto que proceden del óvulo.

6. ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de expresión de un gen improntado parentalmente?

- a) Aborto espontáneo.
- b) Malformaciones congénitas.
- c) Desarrollo embrionario normal.
- d) Ninguna de las anteriores.

7. ¿Cuál es el mecanismo de la impronta parental?

- a) Modificación de la estructura del ADN.
- b) Modificación de la expresión de los genes.
- c) Modificación de la estructura de la cromatina.
- d) Todas las anteriores.

8. ¿Qué relación existe entre la impronta parental y la herencia?

- a) La impronta parental es un tipo de herencia.
- b) La impronta parental no es un tipo de herencia.
- c) La impronta parental puede afectar a la herencia.
- d) La impronta parental no puede afectar a la herencia.

9. ¿Qué relación existe entre la impronta parental y el desarrollo embrionario?

- a) La impronta parental es fundamental para el desarrollo embrionario.
- b) La impronta parental no es fundamental para el desarrollo embrionario.
- c) La impronta parental puede afectar al desarrollo embrionario.
- d) La impronta parental no puede afectar al desarrollo embrionario.

10. ¿Cuál es el futuro de la investigación sobre la impronta parental?

- a) Descubrir nuevos genes improntados parentalmente.
- b) Comprender mejor el mecanismo de la impronta parental.
- c) Aplicar la investigación sobre la impronta parental a la medicina.
- d) Todas las anteriores.

Cuestionario segmentación del cigoto

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de segmentación que ocurre en los mamíferos?

(a) Holoblástico

(b) Meroblástico

(c) Discoidal

(d) Meroblastic discoidal

2. ¿Cuál de los siguientes es un rasgo característico de la segmentación en mamíferos?

(a) Las primeras divisiones son simétricas.

(b) Las primeras divisiones son asincrónicas.

(c) Las primeras divisiones son meridionales.

(d) Las primeras divisiones son ecuatoriales.

3. ¿Cuál de los siguientes es el nombre del estadio de desarrollo del embrión que consta de unas 16 células?

(a) Mórula

(b) Blastocisto

(c) Cigoto

(d) Trofoblasto

4. ¿Qué es la compactación?

(a) La división del embrión en dos capas.

(b) La adhesión de las células del embrión entre sí.

(c) La formación de un espacio lleno de líquido en el embrión.

(d) La formación de la placenta.

5. ¿Cuál de los siguientes es el nombre del estadio de desarrollo del embrión que consta de dos capas: el trofoblasto y la masa celular interna?

(a) Mórula

(b) Blastocisto

(c) Cigoto

(d) Trofoblasto

6. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de la capa externa del blastocisto?

(a) Mórula

(b) Blastocisto

(c) Cigoto

(d) Trofoblasto

7. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de la capa interna del blastocisto?

(a) Mórula

(b) Blastocisto

(c) Cigoto

(d) Trofoblasto

8. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de la célula que da lugar al cuerpo mismo del embrión y a varias estructuras extraembrionarias?

(a) Mórula

(b) Blastocisto

(c) Cigoto

(d) Masa celular interna

9. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de la célula que da lugar a las estructuras extraembrionarias, incluidas las capas más externas de la placenta?

(a) Mórula

(b) Blastocisto

(c) Cigoto

(d) Trofoblasto

10. ¿Cuál de los siguientes factores participa en el mantenimiento de la actividad mitótica en el trofoblasto?

(a) Factor de crecimiento fibroblástico-4

(b) Factor de crecimiento epidérmico

(c) Factor de crecimiento de hepatocito

(d) Factor de crecimiento de queratinocitos

Cuestionario de transporte e implantación del embrión

- 1. ¿Cuál de los siguientes es el período de tiempo durante el cual el embrión viaja desde la trompa de Falopio hasta el útero?**
 - a) 1 día
 - b) 3 días**
 - c) 4 días
 - d) 7 días

- 2. ¿Cuál de los siguientes es una de las etapas de la implantación del embrión?**
 - a) Adhesión
 - b) Penetración
 - c) Invasión
 - d) Todas las anteriores**

- 3. ¿Cuál de los siguientes es un factor que puede influir en la implantación exitosa del embrión?**
 - a) La calidad del embrión
 - b) La preparación del endometrio**
 - c) La respuesta inmunitaria de la madre
 - d) Todas las anteriores

- 4. La zona pelúcida es una estructura que rodea al óvulo y al embrión en las primeras etapas del desarrollo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la composición de la zona pelúcida?**
 - a) Está compuesta principalmente de proteínas.
 - b) Está compuesta principalmente de lípidos.
 - c) Está compuesta principalmente de glicoproteínas.**
 - d) Está compuesta principalmente de ácido hialurónico.

- 5. La zona pelúcida tiene dos funciones principales: protección y regulación. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la función protectora de la zona pelúcida?**
 - a) Protege al óvulo y al embrión de daños mecánicos.
 - b) Protege al óvulo y al embrión de daños químicos.**
 - c) Protege al óvulo y al embrión de infecciones.
 - d) Protege al óvulo y al embrión de la entrada de espermatozoides.

- 6. Después de la fecundación, la zona pelúcida se somete a un proceso de eclosión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la eclosión de la zona pelúcida?**
 - a) Se produce por la acción de enzimas proteolíticas liberadas por las células del blastocisto.**

- b) Se produce por la acción de enzimas proteolíticas liberadas por las células trofoblásticas del blastocisto.
- c) Se produce por la acción de enzimas proteolíticas liberadas por las células del endometrio.
- d) Se produce por la acción de enzimas proteolíticas liberadas por las células del ovario.

7. ¿Cuál de los siguientes es una función de la zona pelúcida?

- a) Proteger al embrión de la invasión de microorganismos
- b) Facilitar el transporte del embrión a través de la trompa de Falopio
- c) Permitir la adhesión del embrión al endometrio
- d) Todas las anteriores

8. ¿Cuál de los siguientes es una molécula de adhesión que participa en la implantación del embrión?

- a) La integrina
- b) La interleucina 2
- c) La progesterona
- d) Ninguna de las anteriores

9. ¿Cuál de los siguientes es una hormona que contribuye a la preparación del endometrio para la implantación?

- a) La progesterona
- b) La estrógeno
- c) La hormona luteinizante
- d) Todas las anteriores

10. ¿Cuál de los siguientes es una técnica de reproducción asistida que puede ayudar a las mujeres con problemas de implantación?

- a) La fertilización in vitro (FIV)
- b) La transferencia intratubárica de gametos (GIFT)
- c) La inseminación artificial (IA)
- d) Todas las anteriores

Cuestionario de Fecundación

- 1. ¿Qué hormona es responsable de desencadenar la ovulación?**
 - a) FSH
 - b) LH**
 - c) Progesterona
 - d) Estrógeno
- 2. Durante la ovulación, el folículo de De Graaf madura bajo la influencia de:**
 - a) LH
 - b) Progesterona
 - c) FSH y LH**
 - d) FSH y estrógeno
- 3. ¿Qué ocurre después del pico de LH?**
 - a) Expulsión del óvulo**
 - b) Fecundación del óvulo
 - c) Ruptura del folículo
 - d) Implantación
- 4. ¿Qué es el cúmulo ovífero?**
 - a) Un grupo de folículos
 - b) Células que rodean al óvulo durante su expulsión**
 - c) Células del útero
 - d) El líquido antral
- 5. ¿Qué es el mittelschmerz?**
 - a) Dolor leve o intenso durante la ovulación**
 - b) Dolor abdominal crónico
 - c) Proceso de rotura folicular
 - d) Un tipo de hemorragia
- 6. ¿Cuál es la función principal de las fimbrias de la trompa de Falopio?**
 - a) Movilizar el líquido antral
 - b) Facilitar la fecundación
 - c) Capturar el óvulo expulsado**
 - d) Romper el folículo
- 7. El transporte del óvulo a través de la trompa de Falopio dura aproximadamente:**
 - a) 1-2 días
 - b) 3-4 días**
 - c) 5-6 días
 - d) 6-7 días
- 8. ¿Qué factor NO influye en el transporte de espermatozoides?**
 - a) pH de la vagina
 - b) Cantidad de semen
 - c) Motilidad de los cilios uterinos
 - d) Presencia de células de Sertoli**

- 9. ¿Qué proceso es necesario para que el espermatozoide penetre la corona radiada?**
- a) Secreción de ácido hialurónico
 - b) Movimientos flagelares y hialuronidasa**
 - c) Ruptura del folículo
 - d) Captura del óvulo
- 10. ¿Cuál es la función principal de la zona pelúcida?**
- a) Regular la secreción de LH
 - b) Facilitar la penetración del espermatozoide**
 - c) Evitar la poliespermia
 - d) Producir estrógenos
- 11. ¿Cuál es el nombre de la proteína que permite la unión entre el espermatozoide y el óvulo?**
- a) Fertalina
 - b) ZP3**
 - c) Integrina $\alpha 6$
 - d) Protamina
- 12. El proceso de fusión de las membranas del óvulo y espermatozoide se inicia gracias a:**
- a) Hialuronidasa
 - b) Reacción acrosómica
 - c) Progesterona
 - d) Síntesis de prostaglandinas
- 13. ¿Qué bloquea la poliespermia de manera rápida en mamíferos?**
- a) Liberación de enzimas lisosomales**
 - b) Despolarización de la membrana plasmática del óvulo
 - c) Contracción de la trompa de Falopio
 - d) Bloqueo de LH
- 14. ¿Qué inicia la activación metabólica del óvulo?**
- a) Liberación de LH
 - b) Aumento de la respiración celular
 - c) Entrada del espermatozoide**
 - d) Formación del cigoto
- 15. ¿Qué función tiene el glutatión reducido en la reestructuración del espermatozoide?**
- a) Despolariza la membrana del óvulo
 - b) Libera los puentes disulfuro**
 - c) Facilita la activación metabólica del óvulo
 - d) Induce la meiosis

16. Después de la penetración del espermatozoide, el núcleo del óvulo completa:

- a) La primera división meiótica
- b) La mitosis
- c) La segunda división meiótica
- d) La fecundación

17. ¿Cuánto tiempo persisten los pronúcleos femenino y masculino tras la fecundación?

- a) 6-8 horas
- b) 10-12 horas
- c) 24 horas
- d) 48 horas

18. ¿Cuál es el resultado final de la fusión de los pronúcleos?

- a) Formación del cigoto
- b) División meiótica
- c) Penetración del óvulo
- d) Formación del cúmulo ovífero

19. ¿Qué hormona mantiene al cuerpo lúteo durante el embarazo?

- a) LH
- b) Progesterona
- c) Gonadotropina coriónica
- d) FSH

20. En ausencia de fecundación, el cuerpo lúteo:

- a) Se mantiene activo
- b) Degenera y es reemplazado por tejido colagenoso
- c) Se convierte en cigoto
- d) Forma un cuerpo lúteo grande

21. ¿Cuál es el proceso que sigue a la rotura folicular?

- a) Fecundación inmediata
- b) Expulsión del óvulo y líquido antral
- c) Formación de la corona radiada
- d) Captura del espermatozoide

22. ¿Qué estructura facilita la captura del óvulo por la trompa de Falopio?

- a) Metaloproteinasas
- b) Cilios
- c) Hialuronidasa
- d) FSH

23. ¿Qué componente del semen protege a los espermatozoides del pH ácido de la vagina?

- a) Proteínas
- b) Hialuronidasa
- c) Fructosa
- d) Alcalinidad del semen

24. ¿Qué es la luteólisis?

- a) Ruptura folicular
- b) Proceso de degeneración del cuerpo lúteo**
- c) Formación del cigoto
- d) Fusión de los pronúcleos

25. ¿Qué etapa del transporte del óvulo implica una fase rápida de 8 horas?

- a) Fase de la ampolla**
- b) Fase ístmica
- c) Fase uterina
- d) Fase folicular

26. ¿Qué bloquea el acceso de espermatozoides al óvulo inmediatamente después de la fecundación?

- a) Reacción acrosómica
- b) Despolarización de la membrana plasmática
- c) Reacción de zona
- d) Acción de metaloproteinasas**

27. ¿Cuáles son las células que secretan progesterona después de la ovulación?

- a) Células del cúmulo
- b) Células luteínicas de la granulosa**
- c) Células de Sertoli
- d) Células tecales

28. ¿Qué ocurre durante la migración del núcleo del ovocito?

- a) Despolarización del núcleo**
- b) Contracción de filamentos de actina
- c) Formación de un pronúcleo masculino
- d) Ruptura del cúmulo ovífero

29. ¿Qué proteína forma los puentes cruzados en la zona pelúcida?

- a) ZP1
- b) ZP2**
- c) ZP3
- d) Fertilina

30. ¿Qué proceso describe el aumento del metabolismo oxidativo en el óvulo tras la fecundación?

- a) Reacción de zona
- b) Activación metabólica del óvulo**
- c) Ruptura folicular
- d) Formación del cúmulo ovífero