

**ANTROPOMORFIA
MEDICA
ANTROPOMORFIA**

D R . F E L I X C H A N G

ENFERMEDADES *EXANTEMATICAS*

SAMUEL VASQUEZ NANDAYAPA / 1 A

DENGUE

```
graph TD; DENGUE --> Definición; DENGUE --> Diagnóstico; DENGUE --> P_de_incubación_y_contagio; Definición --> Signos_y_síntomas; Diagnóstico --> Tratamiento; P_de_incubación_y_contagio --> Tratamiento;
```

Definición

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos infectados, principalmente el *Aedes aegypti*.

Signos y síntomas:

- Fiebre alta
- Dolor de cabeza intenso
- Dolor detrás de los ojos
- Dolor muscular y en las articulaciones
- Erupción cutánea
- Náuseas y vómitos
- Sangrado por la nariz o las encías
- Fatiga
- Debilidad
- En casos graves, puede haber shock, dificultad respiratoria y sangrado grave.

Diagnóstico

Se realiza mediante análisis de sangre para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus del dengue.

P. de incubación y contagio:

El periodo de incubación es de 4 a 10 días.

Tratamiento

No existe un tratamiento específico para el dengue. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación. En casos graves, puede ser necesaria la hospitalización y la administración de líquidos intravenosos

SARAMPION

Definición

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que se transmite por vía aérea a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada

Signos y síntomas:

- Fiebre alta
- Tos
- Rinorrea (moqueo)
- Conjuntivitis (ojos rojos)
- Manchas blancas en la cara interna de la mejilla (manchas de Koplik)
- Erupción cutánea roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Diagnóstico

Se realiza mediante un examen físico y análisis de sangre para confirmar la presencia del virus.

P. de incubación y contagio:

El periodo de incubación es de 10 a 12 días. La persona infectada es contagiosa desde 4 días antes de la aparición de la erupción hasta 4 días después.

Tratamiento

Antifebriles (ibuprofeno),
Antibióticos, Vitamina A
(200,000 UI)

RUBEOLA

Definición

La rubéola es una enfermedad viral contagiosa, también conocida como sarampión alemán o sarampión de tres días. Se transmite por vía aérea a través de las gotitas respiratorias de una persona infectada

Signos y síntomas:

- Fiebre baja
- Dolor de cabeza
- Dolor de garganta
- Conjuntivitis
- Erupción cutánea roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

P. de incubación y contagio:

El periodo de incubación es de 14 a 21 días. La persona infectada es contagiosa desde 7 días antes de la aparición de la erupción hasta 7 días después

Diagnóstico

Se realiza mediante un examen físico y análisis de sangre para confirmar la presencia del virus, ya sea actual o pasada.

Tratamiento

Reposo en cama
Acetaminofén

VARICELA

Definición

La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus varicela-zóster

Signos y síntomas:

- Fiebre
- Malestar general
- Erupción cutánea con ampollas que producen mucha picazón.

Diagnóstico

Se realiza mediante un examen físico, también se puede confirmar con pruebas de laboratorio, lo que incluye un análisis de sangre o un estudio de los tejidos de la piel afectada.

P. de incubación y contagio:

El periodo de incubación es de 10 a 21 días. La persona infectada es contagiosa desde 1 a 2 días antes de la aparición de la erupción hasta que todas las ampollas se han secado y formado costras.

Tratamiento

Antihistamínico para aliviar la picazón

QUINTA ENFERMEDAD

```
graph TD; A[QUINTA ENFERMEDAD] --> B[Definición]; A --> C[P. de incubación y contagio:]; A --> D[Diagnóstico]; B --> E[Signos y síntomas:]; D --> E; C --> F[Tratamiento]; D --> F;
```

Definición

La quinta enfermedad, también llamada eritema infeccioso, es una enfermedad viral causada por el parvovirus B19.

Signos y síntomas:

- Fiebre baja
- Dolor de cabeza
- Dolor de garganta
- Erupción cutánea roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo

P. de incubación y contagio:

El periodo de incubación es de 4 a 14 días. La persona infectada es contagiosa desde 1 a 2 días antes de la aparición de la erupción.

Diagnóstico

Se puede llegar a el diagnostico basándose en el característico sarpullido en forma de "bofetada"

Tratamiento

Acetaminofeno o ibuprofeno, pueden ayudar a aliviar fiebre, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones.

QUINTA ENFERMEDAD

```
graph TD; Title[QUINTA ENFERMEDAD] --> Definición[Definición]; Title --> Incubación[P. de incubación y contagio:]; Title --> Signos[Signos y síntomas:]; Title --> Diagnóstico[Diagnóstico]; Diagnóstico --> Diagnóstico; Incubación --> Tratamiento[Tratamiento];
```

Definición

La quinta enfermedad, también llamada eritema infeccioso, es una enfermedad viral causada por el parvovirus B19.

Signos y síntomas:

- Fiebre baja
- Dolor de cabeza
- Dolor de garganta
- Erupción cutánea roja que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo

P. de incubación y contagio:

El periodo de incubación es de 4 a 14 días. La persona infectada es contagiosa desde 1 a 2 días antes de la aparición de la erupción.

Diagnóstico

Se puede llegar a el diagnostico basándose en el característico sarpullido en forma de "bofetada"

Tratamiento

Acetaminofeno o ibuprofeno, pueden ayudar a aliviar fiebre, dolor de cabeza y dolor en las articulaciones.

SEXTA ENFERMEDAD

```
graph TD; Title[SEXTA ENFERMEDAD] --> Definición[Definición]; Title --> Incubación[P. de incubación y contagio:]; Title --> Signos[Signos y síntomas:]; Title --> Diagnóstico[Diagnóstico]; Diagnóstico --> DiagnósticoText[Analizar el patrón de fiebre alta seguida de un sarpullido.]; Signos --> SignosList[• Fiebre alta  
• Irritabilidad  
• Pérdida de apetito  
• Erupción cutánea roja que aparece después de que la fiebre desaparece.]; Tratamiento[Tratamiento] --> TratamientoText[Acetaminofeno pediátrico (Tylenol) puede ayudar a bajar la fiebre  
Baños fríos y reposo.];
```

Definición

La sexta enfermedad, también llamada exantema súbito o roséola infantil, es una enfermedad viral causada por el virus herpes humano tipo 6 (HHV-6).

Signos y síntomas:

- Fiebre alta
- Irritabilidad
- Pérdida de apetito
- Erupción cutánea roja que aparece después de que la fiebre desaparece.

P. de incubación y contagio:

El periodo de incubación es de 5 a 15 días. La persona infectada es contagiosa desde 1 a 2 días antes de la aparición de la erupción hasta que todas las ampollas se han secado y formado costras.

Diagnóstico

Analizar el patrón de fiebre alta seguida de un sarpullido.

Tratamiento

Acetaminofeno pediátrico (Tylenol) puede ayudar a bajar la fiebre
Baños fríos y reposo.