



ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

MATERIA:

CANCINO VELASQUEZ REYES ROMAN

DOCENTE:

PEÑA RUIZ ALEJANDRA GUADALUPE

ALUMNA:

CICLO ESTRAL DE LA PERRA

Etapas del celo en las perras.



Las perras se clasifican como hembras monoéstricas estacionales, esto quiere decir que presenta un estro una o dos veces al año, a intervalos de 5 a 10 meses. A continuación veremos las diferentes fases del ciclo sexual.

ANESTRO:

periodo prolongado que dura alrededor de unos cuatro meses. En este periodo la hembra no evidencia signos de actividad ovárica.


SÍNTOMAS DEL PRIMER CELO DE UNA PERRITA

Secreción sanguinolenta de la vulva, que puede ser de distintas tonalidades, e hinchazón de la misma. Los machos no castrados se sienten atraídos. En la fase inicial la perra rechazará a los machos. En la fase final, se aceptará el apareamiento.



PROESTRO:

periodo de importante actividad folicular, se caracteriza por la aparición de signos tales como edema de la vulva, descarga vaginal sanguinolenta y atracción del macho. Esta fase dura unos 9 días.



ESTRO:

destaca la receptividad sexual por parte de la hembra y una marcada queratinización del epitelio vaginal. La duración promedio de esta fase es de 9 días. Durante el primer tercio del estro suele tener lugar la ovulación e inicio del desarrollo de los cuerpos lúteos.



Etapas del celo en perritas

CICLO ESTRAL DE LA PERRA



DIESTRO:

esta fase aparece cuando finaliza la receptividad sexual y el nivel de queratinización celular del epitelio vaginal disminuye significativamente. El periodo de diestro dura alrededor de 60 a 90 días.

PERIODO DE GESTACIÓN

depende de la raza y el propio animal, pero oscila entre los 63 y los 67 días. Es decir, en torno a las 10 semanas.



PSEUDOGESTACIÓN O EMBARAZO PSICOLÓGICO (PSEUDOGESTACIÓN)

La pseudogestación es una condición fisiológica que se genera a partir del DIESTRO y que solo eventualmente podría constituir un trastorno. Es una exageración del fenómeno fisiológico normal de la perra no gestante, que completa la fase luteínica del ciclo estral.

SIGNOS CLINICOS:

- Aumento de peso.
- Hipertrofia mamaria con o sin secreción láctea.
- Secreción vaginal mucoide.
- Inapetencia.
- Inquietud.
- Conducta de "nido".
- Adopción de objetos inanimados.

https://www.cveterinariafauna.es/ciclo-estral-perra.html

<https://www.cveterinariafauna.es/ciclo-estral-perra.html>