



Universidad del sureste

PEQUEÑAS ESPECIES

MATERIA

7B

CUATRIMESTRE Y GRUPO

MEDICO JOSE ROMAN

CATEDRATICO

VANIA MARTINEZ LOPEZ

NOMBRE DE LA ALUMNA

LIC MEDICINA VETERINARIA ZOOTECNIA

ESQUEMA DE VACUNACION

Vacunas	Indicaciones	Administración	Reacciones
Puppy Dp	Se puede administrar a cachorros a partir de las 4 semanas de edad. Se debe realizar una exploración clínica adecuada y asegurarse de que el perro está en buen estado de salud antes de administrarla	Se debe inyectar por vía subcutánea. Después de la vacunación, se debe evitar que el perro entre en contacto con posibles fuentes de infección durante 14 días.	Inflamación no dolorosa en el lugar de la inyección, que se resuelve en unos pocos días. Lloraqueo y/o rasquidos en el lugar de la inyección. Reacción de hipersensibilidad, incluida la anafilaxia, que puede ser mortal
Dhppi	es una vacuna viva combinada contra el moquillo, la hepatitis infecciosa canina producida por adenovirus canino tipo 1, infecciones por adenovirus canino tipo 2	Se recomienda para completar el esquema básico de vacunación de cachorros y para la revacunación anual de perros adultos	Inflamación, dolor, enrojecimiento o calor en el punto de inyección Fiebre leve Vómitos y diarrea
Dhppi - Polivalente	protege contra parvovirus, moquillo, hepatitis, leptospirosis y parainfluenza	Es una vacuna modificada de aplicación intranasal que contiene el virus atenuado de la parainfluenza canina, cepa Cornell y un cultivo	reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación
Rabia	importante para prevenir el desarrollo de la rabia en perros y evitar que la enfermedad se transmita a las personas	Generalmente a los cachorros de entre 3 y 6 meses de edad En algunos casos, se puede vacunar a perros adultos sin historial de vacunación, y se tiene que aplicar anualmente	se administra en la parte posterior de la pierna del perro o en una zona de piel que se pueda retraer fácilmente