



Universidad del sureste

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

7mo Cuatrimestre Grupo B

Asignatura:

Zootecnia de pequeñas especies

Docente:

M.V.Z: Román Reyes Vasquez Cancino

Tema:

Esquema de vacunacion en perros (Tabla descriptiva)

Alumno:

Margarita Concepción Martinez Trujillo

Fecha:

Sábado 30 noviembre del 2024

Esquema de vacunacion en perros

Vacunas	Enfermedad que Previene	Primera Dosis	Refuerzos	Descripción de la Enfermedad
Parvovirus	Parvovirus Canino	6 - 8 semanas	Cada 3-4 semanas hasta las 16 semanas; luego refuerzo anual.	Enfermedad viral altamente contagiosa que causa diarrea severa, vómitos, deshidratación y puede ser mortal, especialmente en cachorros.
Moquillo	Moquillo Canino (Distemper)	6 - 8 semanas	Cada 3-4 semanas hasta las 16 semanas; refuerzo anual.	Virus que afecta al sistema respiratorio, digestivo y nervioso, causando fiebre, secreciones, tos y problemas neurológicos.
Hepatitis	Adenovirus Canino tipo 1 (Hepatitis infecciosa canina) y Adenovirus tipo 2 (infecciones respiratorias) 6 - 8	6 - 8 semanas	Cada 3-4 semanas hasta las 16 semanas; refuerzo anual.	Virus que ataca el hígado, los riñones y otros órganos, provocando fiebre, vómitos, dolor abdominal y, en casos graves, muerte.
Leptospirosis	Leptospirosis Canina	8 - 9 semanas	Refuerzo 3-4 semanas después de la primera dosis; refuerzo anual.	Enfermedad bacteriana que afecta los riñones y el hígado, y puede transmitirse a los humanos; causa fiebre, letargo, vómitos y daño orgánico.
Parainfluenza	Virus de Parainfluenza Canina (parte del complejo respiratorio infeccioso, "tos de las perreras")	6 - 8 semanas	Cada 3-4 semanas hasta las 16 semanas; refuerzo anual.	Virus que causa infecciones respiratorias, caracterizadas por tos seca, secreciones nasales y, en casos severos, neumonía.
Antirrábica	Rabia	12 semanas	Refuerzo anual	Enfermedad viral mortal que afecta al sistema nervioso central de animales y humanos; se transmite a través de mordeduras.
Tos de las perreras BORDETELLA	Bordetella bronchiseptica (parte del complejo respiratorio infeccioso)	8 - 12 semanas	Refuerzo anual o cada 6 meses en perros con alto riesgo de exposición	Infección bacteriana que provoca tos persistente, secreciones nasales y dificultad respiratoria; altamente contagiosa en ambientes cerrados.
Coronavirus	Coronavirus canino (opcional, depende de la región y riesgos locales)	6 - 8 semanas	Cada 3-4 semanas hasta las 16 semanas; refuerzo anual.	Virus que afecta el sistema digestivo, causando diarrea leve a moderada, fiebre y vómitos; menos severo que el parvovirus.
Giardia	Giardia (opcional, depende del riesgo de exposición)	12 semanas	Segunda dosis 2-4 semanas después; refuerzo anual.	Parásito que causa diarrea persistente, pérdida de peso y deshidratación, especialmente en perros jóvenes o inmunocomprometidos.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.gmx.com.mx/blog-gmx/calendario-de-vacunas-para-tu-perro.html>
- https://www.tiendanimal.es/articulos/plan-de-vacunacion-para-cachorros/?srsltid=AfmBOoqxZODmQPSELQaFc51djJuvM967X3X_Yq_Yw2iNSjUcPv9TRrrq