

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Zootecnia de pequeñas especies

Tema: Esquema de vacunación en perros

Docente: Román Velázquez Cancino

Cuatrimestre: 7to Cuatrimestre

Enfermedad	Vacuna	Manifestaciones clínicas
Parvovirus.	Esta debe ser aplicada en cachorros de entre 6 y 8 semanas de vida. Se debe repetir entre las 12 y 16 semanas de vida.	Fiebre, deshidratación, diarrea, anorexia, vomito, depresión, cefalea, dolor abdominal, malestar estomacal.
Moquillo.	Aplicar a los cachorros entre las 6 y 8 semanas de vida.	Respiratoria: secreción nasal y tos Digestiva: gastroenteritis, vomitos y diarrea Cutánea: dermatitis con engrosamiento de la piel de la nariz Nerviosa: espasmos musculares Ocular: signos de conjuntivitis
Rabia.	Se debe aplicar aproximadamente a las 12 semanas de edad. Posteriormente a las 16 semanas y finalmente cada año.	Hidrofobia, deshidratación, babeo excesivo, parálisis, agresión extrema.
Leptospira.	La primera dosis para los cachorros deberá ser a partir de las 8 semanas de edad y luego cumplir las 12 semanas de edad para concluir el ciclo.	Fiebre alta, gastroenteritis, ictericia, deshidratación, letargo, insuficiencia renal aguda.
Hepatitis.	Se recomienda al momento de la vacunación del moquillo. Cachorros entre 9 y 12 semanas de vida.	Letargo, sed, anorexia, conjuntivitis, dolor abdominal, vomitos.

Referencias

[Esquema de vacunación de cachorros: cuándo vacunarlos | Purina](#)