



ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

MATERIA:

CANCINO VELASQUEZ REYES ROMAN

DOCENTE:

PEÑA RUIZ ALEJANDRA GUADALUPE

ALUMNA:

ESQUEMA DE VACUNACION EN PERROS

enfermedad	vacuna	descripción	edad	previene
Moquillo canino	especial en cachorros	Otra enfermedad preocupante para la que querrás vacunar a tu perro es el moquillo canino. Esta enfermedad ataca al sistema gastrointestinal (GI), respiratorio y nervioso de los perros infectados.	6-8 semanas	parvovirus, distemper
Parvovirus	polivalente canina	Este virus afecta principalmente el tracto intestinal de los perros no vacunados y daña el corazón, los tejidos linfáticos y la médula ósea.	8-10 semanas	parvovirus, distemper, hepatitis, parainfluenza , leptospirosis
Leptospira	polivalente canina	. Los perros se infectan cuando entran en contacto con la orina de animales infectados, como ratas, mapaches, zarigüeyas, lobos, ciervos y más. Si no se trata rápidamente, la infección puede causar daños hepáticos y renales graves, y potencialmente la muerte.	12-14 semanas	parvovirus, Distemper, hepatitis ,parainfluenza , leptospirosis
tos de la perreras	traqueobronquitis	la tos de las perreras es la parainfluenza canina, que ocurre cuando muchos perros están en contacto estrecho entre sí, especialmente en residencias para mascotas	16-18 semanas	parainfluenza ,bordetelosis
rabia	antirrábica	Vacunar a tu perro contra la rabia es fundamental, ya que esta enfermedad puede provocar síntomas graves para los perros e incluso la muerte.	20-24 semanas	rabia

<https://www.purina.com/es/articulos/perro/cachorro/salud/programa-de-vacunacion-para-cachorros>