



Nombre de alumno: Nadia Angélica Pérez Flores.

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López.


Nombre del trabajo: Calendario.

Materia: Zootecnia de pequeñas especies.



Grado: 7°

Grupo: Medicina veterinaria y zootecnia.



Ocosingo, Chiapas 12 de octubre de 2024




VACUNAS Y DESPARASITACIÓN EN CANINOS.





VACUNA O DESPARASITANTE	EDAD	APLICACIÓN
Parvo-corona (parvovirus y coronavirus).	Entre las 14 y 16 semanas de edad	SC o IM.
Triple (moquillo, hepatitis y leptospira).	A partir de las 8 o 9 semanas de edad.	IM o SC
Cuadruple (moquillo, hepatitis, parvovirus y adenovirus).	<ul style="list-style-type: none">• Recombitek® C3 Para perros sanos de seis semanas de edad o más.• Canigen MHA2PL Para perros a partir de las 8 semanas	SC
Quintuple (moquillo, hepatitis, parvovirus, adenovirus y parainfluenza).	A partir de las 6 semanas de edad.	SC o IM
Sextuple (moquillo, hepatitis, parvovirus, adenovirus, para influenza mas 4 tipos de leptospira).	A partir de los 2 meses de edad.	SC o IM
Rabia	A partir de los 3 meses de edad, y luego se debe revacunar cada año.	IM o SC
Giardia	A partir de las 8 semanas de edad	SC








VACUNAS Y DESPARASITACIÓN EN CANINOS.





VACUNA O DESPARASITANTE	EDAD	APLICACIÓN
Parvigen (Parvovirus)	Entre la 6 y 8 semanas de edad	SC.
Puppy MHA2 (Moquillo, hepatitis infecciosa y parvovirus)	Entre las 6 y 8 semanas de edad.	IM o SC
Puppy Extra (Moquillo, hepatitis infecciosa, parvovirus y complejo respiratorio).	Se debe aplicar a cachorros de 8 semanas de edad. La revacunación se debe realizar 3 a 4 semanas después de la primera dosis.	SC
Milpro (Antiparasitario interno para perros y gatos, indicado para el tratamiento de infestaciones por cestodos (tenias) y nematodos (gusanos redondos).	Depende del tipo de Milpro y el peso del animal. No usar en cachorros de menos de 2 semanas de edad y que pesen menos de 0.5 kg.	Oral.
Endogard tratamiento de infestaciones por cestodos (tenias) y nematodos (gusanos redondos) incluyendo el gusano del corazón así como giardias.	No administrar este producto a animales menores de 4 semanas de edad. Se puede plicar a cachorros desde la segunda semana de edad. Depende del peso del animal.	Oral







VACUNAS Y DESPARASITACIÓN EN CANINOS.





VACUNA O DESPARASITANTE	EDAD	APLICACIÓN
One control y tratamiento de parasitosis ocasionadas por coccidios (<i>Cystoisospora</i> spp.), protozoarios (<i>Giardia</i> spp.), nematodos (<i>Toxocara</i> spp., <i>Ancylostoma</i> spp., <i>Toxacaris</i> spp., <i>Trichuris</i> spp.)	A partir de las 3 semanas de edad	Oral
Iverkan antiparasitario de amplio espectro que se utiliza para tratar a perros de cestodos, nematodos y protozoarios	Se puede administrar a cachorros desde las 6 semanas de edad.	Oral
Vermiplex Antihelmíntico y tenicida para el tratamiento de parasitosis internas en perros, causadas por: <i>Toxocara canis</i> , <i>Toxascaris leonina</i> , <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> , <i>Taenia</i> spp., <i>Echinococcus granulosus</i> , <i>Multiceps</i> spp.	A partir de las 2 semanas de edad, repitiendo la dosis cada 15 días hasta los 3 meses de edad.	Oral
Coccimed Para el tratamiento de parasitosis internas en caninos ocasionadas por: <i>Toxocara canis</i> , <i>T. leonina</i> , <i>Ancylostoma caninum</i> , <i>Uncinaria stenocephala</i> , <i>Trichuris vulpis</i> , <i>Taenia</i> spp, <i>Giardi lamblia</i> , <i>Eimeria</i> spp, <i>Capillaria aerophilia</i> , <i>Filaroides hirthi</i> , <i>Paragonimus kellicoti</i> , <i>Dipylidium caninum</i> , <i>Echinococcus granulosis</i> y coccidias.	A partir de las 8 semanas de edad. No administrar en caninos menores de 4 semanas de edad.	Oral





VACUNAS Y DESPARASITACIÓN EN CANINOS.



VACUNA O DESPARASITANTE	EDAD	APLICACIÓN
<p>Simparica trio es un desparasitante masticable para perros que sirve para tratar y eliminar infestaciones de pulgas, garrapatas y ácaros que causan sarna</p>	<p>Administrada a perros de 8 semanas de edad y mayores.</p>	<p>Oral</p>
<p>Credelio se utiliza para tratar infestaciones de pulgas y garrapatas en perros y gatos.</p>	<p>A partir de la 8 semana de edad.</p>	<p>Oral</p>
<p>Nexgard es un desparasitante para perros que sirve para eliminar pulgas, garrapatas, ácaros, gusanos intestinales y tisulares, y prevenir el gusano del corazón.</p>	<p>A partir de las 8 semanas de edad, siempre que pese al menos 2 kg.</p>	<p>Oral</p>
<p>Drontal es un medicamento antiparasitario oral para perros que sirve para eliminar parásitos intestinales. Drontal Plus y Drontal Puppy son dos de sus presentaciones.</p> <p>Son eficaces contra gusanos redondos, tenias, ancylostomas y tricocéfalos en perros, y contienen tres ingredientes activos que actúan de forma conjunta para matar parásitos intestinales.</p>	<p>Puede ser administrado en cachorros de todas las razas de perros a partir de las 2 semanas y hasta los 3 meses de edad.</p>	<p>Oral</p>

