



Nombre de alumno: Angel Rubisel Hernández
Gómez

Nombre del profesor: Mtra. Sandra Edith Moreno
López

Nombre del trabajo: Plan de vacunación

Materia: Zootecnia de pequeñas especies

Grado: 7°

Grupo: Medicina veterinaria y zootecnia



Plan de vacunación para cachorros



Vacuna	Edad	Descripción
1ª dosis vacuna monovalente (solo parvovirus) o bivalente (parvovirus y moquillo)	6 – 8 semanas de edad	Los perros de raza Rottweiler, Husky, Dóberman y Golden, y aquellos que tienen algo de estas razas dentro de su herencia genética, son especialmente vulnerables al Parvovirus, de manera que se les debe administrar la primera dosis de esta vacuna antes de los 45 días.
Vacunación pentavalente (Moquillo canino, Parvovirus, Hepatitis infecciosa C, Leptospirosis y Parainfluenza)	9 semanas de edad	
Revacunación de vacuna pentavalente (2ª dosis).	12 semanas	
Vacuna contra <u>la Rabia</u> + tercera dosis de pentavalente.	3 meses de edad	
Repetir anualmente o bianualmente la vacuna contra la Rabia (en función de la legislación de la CCAA).		
Repetir anualmente la vacunación pentavalente para asegurar que nuestro perro está protegido frente a los principales patógenos.		
Posteriormente, y de manera opcional, podemos protegerlos frente la tos de las perreras, la enfermedad de Lyme, la Leishmaniosis y el Coronavirus.		





Calendario de desparasitación



<i>Desparasitante</i>	Edad	Descripción
<i>Desparasitante interno</i> <i>Ej. Alben puppy (Endoparasitos)</i>	20 o 30 días	El primer mes de vida del cachorro. Antes de la primera vacuna ya debe haber sido desparasitado para que la vacuna actúe eficazmente.
<i>Endoparasitcida, ectoparasitcidas o ambos</i> <i>Ej. Bravecto(Ectoparasitos), endogarb(Endoparasitos), Ivermectina (Endo y ectopasitos)</i>	3 y los 6 meses	
	6 meses	La desparasitación pasa a ser trimestral. Hay un caso especial: si el perro vive en el campo, debe ser mensual, ya que hay más riesgos.

