	Parvovirus	Distemper	Hepatitis y Bronquitis por Adenovirus	Traqueobronquitis por ParaInfluenza	Leptospira	Rabia	SEMANA 6
Parvigen	✓						6-8 semanas de edad. Cachorros o adultos en calendarios tradicionales y bajo riesgo de parvovirosis.
Canigen Puppy MHA2P	✓	✓	✓				6-8 semanas de edad. Se recomienda en cachorros de casa como primer vacuna, con alto riesgo de parvovirosis.
Canigen Triple MHA2/L		✓	✓		✓		6-8 semanas de edad. Se recomienda como refuerzo en cachorros entre 8 y 10 semanas en calendarios tradicionales.
Canigen Quíntuple MHA2PPi/L	✓	✓	✓	✓	✓		8-10 semanas de edad. Se recomienda como refuerzo en cachorros con riesgo a traqueobronquitis mayores de 10 semanas.
Canigen Séxtuple MHA2PPi/LR	✓	✓	✓	✓	✓		Cachorros de 12 semanas o adultos. Se recomienda como el refuerzo anual o última vacuna del calendario de cachorros.
Rabigen–L						✓	Desde la 6a. semana de edad. Revacunación anual.

Plan de Desparasitación

EDAD	Desparasitación Interna y Externa	Antiparasitarios
15 Días	Los Primeros días suelen ser los mas severos y es peor cuando se presentan acaros	Para Cachorros se pueden usar Iverkan, Genesis o One, que son antiparasitarios de Amplio espectro (Suspención)
30 Días	Suelen llegar con aparición de pulgas o garrapatas, se puede hacer examenes para descartar enfermedades como anasplomosis entre otras.	Iverkan o One
45 Días	Se aplica la primer vacuna, en caso que no este desparasitado se le da un desparasitante, y posterior a ellos vacunación de 3--5 dias.	Vermoplex o Depende de los parasitos que se observen por heces o externos, Febandazol, Prazicuantel o Ivermectinas
60 Días	Normalmente llegan por problemas digestivos, producida por parasitosis y anemias hemoliticas	Estudio Coprológico, o un antiparasitario de Amplio espectro
75 Días	En algunos perros se encuentra un parasito muy problematico asi que la desparasitación debe de ser continua en este caso La Giardia o los Trofosoitos	Febendazol, Mebendazol, Metronidazol
3 Meses	Apartir de esta edad los perros son mas activos y toman cualquier cosa, incluyendo el consumo de alimentps y esto lleva a poder obtener Faciola Hepatica o Ancylostomas, Toxocara, Dipilidium o Tenias	Prazicuantel, Abamectina, Mebendazol, y Pamoato de Pirantel
4 Meses	Antiparasitarios especificos por medio de una prueba coprologica o uno de amplio espectro considerando el estado de salud del paciente	Drontal dependiendo peso y talla, tambien nuestro antiparasitario debe de ser de acuerdo a la raza, ya que, algunas son suceptibles a ciertos farmacos de forma individual o por raza
Despues del año	Se considera que cuando son Cachorros son cada 15 dias, pero cuando cumplen tres meses es cada mes y posterior al año cada 3 ,meses	Drontal, Credelio, Iverkan (2.5, 5 a 10 y 30), NexGard, Vermoplex, One, etc.