



**MATERIA:**

# **Zootecnia de conejos**

**NOMBRE DEL CATEDRÁTICO:**

*Sandra Edith Moreno López*

**NOMBRE DE LA ALUMNA:**

*Eduviges Jocabed Gómez Navarro*



## DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE VACUNAS Y DESPARASITACIÓN EN CONEJOS DE PRODUCCIÓN Y MASCOTAS

Conejos de producción:	Conejos mascotas:
Los conejos de producción requieren un programa de vacunación y desparasitación más intensivo debido a la mayor densidad de población y el riesgo de enfermedades.	Los conejos mascotas requieren un programa de vacunación y desparasitación más personalizado y flexible, dependiendo de la edad, salud y estilo de vida del conejo.

## VACUNAS

VACUNAS PARA CONEJOS DE PRODUCCIÓN	VACUNAS PARA CONEJOS MASCOTAS
Vacuna contra la enfermedad hemorrágica del conejo (EHC)	Vacuna contra la enfermedad hemorrágica del conejo (EHC)
Vacuna contra la enfermedad de Myxoma	Vacuna contra la enfermedad de Myxoma
Vacuna contra la enfermedad de la mixomatosis	Vacuna contra la enfermedad de la mixomatosis
Vacuna contra la enfermedad de la septicemia hemorrágica del conejo (SHC)	Vacuna contra la enfermedad de la septicemia hemorrágica del conejo (SHC)
Vacuna contra la enfermedad de la pleuroneumonía del conejo (PNR)	

## VACUNACIÓN EN CONEJOS

Vacuna contra la enfermedad hemorrágica del conejo (EHC):	Vacuna contra la enfermedad de Myxoma:	Otras vacunas:
Esta es una de las enfermedades más comunes y mortales en Conejos.	Esta enfermedad es causada por un virus y puede ser mortal En conejos.	Dependiendo de la región y la situación epidemiológica
La vacuna se administra a los conejos a partir de las 4 semanas de edad y se repite Cada 6-12 meses.	La vacuna se administra a los conejos a partir de las 6 semanas de edad y Se repite cada 6-12 meses.	Pueden ser necesarias otras vacunas, como la vacuna contra La enfermedad de la mixomatosis.

## DESPARASITACIONES EN CONEJOS DE PRODUCCIÓN Y MASCOTAS

Desparasitantes orales	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ivermectina (0,2-0,4 mg/kg cada 7-10 días)</li> <li>2. Albendazol (10-20 mg/kg cada 7-10 días)</li> <li>3. Fenbendazol (10-20 mg/kg cada 7-10 días)</li> <li>4. Praziquantel (5-10 mg/kg cada 7-10 días)</li> <li>5. Febantel (10-20 mg/kg cada 7-10 días)</li> </ol>
Desparasitantes tópicos	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ivermectina (0,1-0,2% en forma de loción o spray)</li> <li>2. Fipronil (0,25-0,5% en forma de loción o spray)</li> <li>3. Imidacloprid (0,1-0,2% en forma de loción o spray)</li> <li>4. Moxidectina (0,1-0,2% en forma de loción o spray)</li> </ol>
Desparasitantes inyectables	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ivermectina (0,2-0,4 mg/kg cada 7-10 días)</li> <li>2. Doramectina (0,2-0,4 mg/kg cada 7-10 días)</li> <li>3. Moxidectina (0,2-0,4 mg/kg cada 7-10 días)</li> </ol>

VACUNACIÓN	DESPARASITACIÓN INTERNA	DESPARASITACIÓN EXTERNA
<p>A partir de las 5 semanas de edad del conejo en una sola dosis y con un recuerdo anual, esta vacuna protege a nuestro conejo de las 3 enfermedades endémicas en nuestro país: la mixomatosis Y la enfermedad hemorrágica clásica (RHDV 1) y la tipo 2 (RHDV 2). Si el conejo acude a nuestro centro veterinario con primer vacunación, adaptamos protocolo a este.</p>	<p>La primera desparasitación se ha de realizar al mes de edad.</p> <p>Durante la vida del conejo, se ha de realizar desparasitaciones cada 4 meses y en caso de encontrar parásitos en las heces se ha de repetir a los 15 días.</p>	<p>Se recomienda realizar desparasitación externa independiente que el conejo tenga acceso con el exterior o conviva con otros animales.</p>
	<p>Se recomienda desparasitar a los conejos de reproducción cada 2-3 meses, utilizando medicamentos como la ivermectina o el albendazol</p>	<p>Es importante desparasitar a los conejos de reproducción contra parásitos externos como piojos, pulgas y ácaros, utilizando productos como la ivermectina o el fipronil</p>

### LA DESPARASITACIÓN EN CONEJOS DOMÉSTICOS

Mes 1-3:	Desparasitación interna con ivermectina o albendazol para controlar parásitos como nematodos y cestodos.
Mes 4-6:	Desparasitación externa con fipronil o imidacloprid para controlar parásitos como piojos, pulgas y ácaros.
Mes 7-9:	Desparasitación interna con ivermectina o albendazol para controlar parásitos como nematodos y cestodos.
Mes 10-12:	Desparasitación externa con fipronil o imidacloprid para controlar parásitos como piojos, pulgas y ácaros.
Los conejos menores de 6 meses	Deben ser desparasitados cada 2 meses.
Los conejos mayores de 6 meses	Pueden ser desparasitados cada 3-4 meses.