



Nombre de alumno: Nadia Angélica Pérez Flores.

Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno López.

Nombre del trabajo: Súper nota.


Materia: Zootecnia de conejos.

Grado: 7°

Grupo: Medicina veterinaria y zootecnia.

Ocosingo, Chiapas 12 de octubre de 2024

*MATANZA QUE SE
REALIZAN EN
LOS CONEJOS.*



PERNO CAUTIVO PENETRANTE/NO PENETRANTE


Se dispara un perno cautivo penetrante al cerebro a través del cráneo. Un perno cautivo no penetrante golpea la frente sin penetrar en el cráneo. Una vez aturdido el conejo, sángralo en menos de 10 segundos para que no sufra

SUJECIÓN Y COLOCACIÓN

- Colocar el conejo en un suelo antideslizante con una barrera trasera para que no pueda salir hacia atrás.
- Sujétar hacia abajo poniendo una mano sobre su pescuezo y hombros, con el pulgar y el índice a ambos lados del pescuezo del conejo.
- Accionar la pistola con la otra mano

Parámetros

- Leer las instrucciones del fabricante para asegurarse de que el perno cautivo sea adecuado para conejos.
- Los pernos cautivos penetrantes deben tener al menos 6 mm de diámetro




ATURDIMIENTO ELÉCTRICO LIMITADO A LA CABEZA

Este método no mata al conejo. Tras el aturdimiento, sangra al conejo en menos de 10 segundos para que no sufra.


PREPARACIÓN DEL EQUIPO

- Humedecer las partes de la cabeza del conejo donde se van a aplicar los electrodos
- Ponerse guantes y botas de goma.



COLOCACIÓN DEL CONEJO

- Sujetar el vientre del conejo o agarrar sus patas traseras con una mano, guía la cabeza agarrando las orejas con la otra mano.
- También se puede agarrar ambas patas traseras del conejo con una mano y guiar con la otra mano la cabeza agarrando las orejas.
- Colocar los electrodos entre las esquinas exteriores de los ojos y la base de las orejas, lejos de la nariz.




GOLPE PERCUTOR EN LA CABEZA

Si se emplea correctamente, este método es letal.

No se puede matar más de 70 conejos al día con este método.

COMPROBACIÓN DE CONSCIENCIA

Hay que asegurarse de que los conejos estén inconscientes antes del sangrado. Comprobar que:



COLOCACIÓN DEL CONEJO

- Agarrarlo por sus patas traseras.
- Utilizar un objeto pesado, pero fácil de manejar (porra, tubería metálica).
- Golpear al conejo en la parte superior de la cabeza, justo por detrás de las orejas.




DESPUÉS DEL ATURDIMIENTO

SI EL CONEJO SIGUE CONSCIENTE

- **No se debe desangrar**
- **Volver a aturdirlo con un método de reserva**
- **Comprobar qué ha ido mal**
- **Correguir los problemas antes de proseguir**


CONFIRMAR LA MUERTE

- **No haya movimientos espontáneos**
- **No hay respuesta al pellizcar o pinchar el hocico, la pata o la oreja**
- **El cuerpo esté inerte/colapsado de manera permanente**
- **Las pupilas estén dilatadas**
- **No haya ruidos/jadeos**
- **No respire**
- **No haya latido**
- **No hay sangrado**



Desangrado

Es un método que consiste en cortar la yugular del animal, provocando la muerte por pérdida de sangre. Este método se utiliza en algunos casos, pero se considera menos humanitario que otros métodos.



Consiste en matarlo agarrando, con una mano, las patas traseras y poniendo los dedos de la otra mano alrededor del cuello del animal; se hace un movimiento que acerque un poco las manos y luego se da un estirón fuerte separando las manos, sin soltar al animal, para que la columna vertebral se separe del cráneo.