

Período Prepatogénico Agente: Trypanosoma Cruzi (parásito). Huésped: Seres humanos y más de 150 mamíferos domésticos y silvestres. Medio ambiente: Zonas rurales con presencia de vectores (América Latina). Período Patogénico Etapa Subclínica - Incubación: 5 a 14 días tras la exposición a heces de insectos infectados.- Latencia: De 20 a 40 días tras la transfusión sanguínea. Etapa Clínica Signos y síntomas específicos: Insuficiencia cardíaca, hinchazón, dificultad para tragar, latidos

Descripción

Etapas de la Historia Natural

de la Enfermedad de Chagas

irregulares. Complicaciones: Muerte súbita, miocardiopatía chagástica, inflamación del músculo. Prevención Primaria Promoción de la salud: - Buena higiene y lavado de manos.-Evitar contacto con animales silvestres.Protección específica:- Mantener

	mascotas limpias y desparasitadas Uso de insecticidas y fumigación conti mosquitos.
Prevención Secundaria	Diagnóstico temprano:- Exploración física y análisis de sangre para confirmar presenc del parásito T. Cruzi.Tratamiento oportuno:

Prevención Terciaria Rehabilitación:- Pacientes con miocardiopatía chagásica requieren programas de entrenamiento físico para

fortalecer su condición.

ra

ia