



UNIVERSIDAD
DEL SURESTE



CUADRO SINOPTICO

**MATERIA: PATOLOGIA Y
TECNICAS QUIRURGICAS DE
PEQUEÑAS ESPECIES**

NOMBRE DEL DOCENTE: ETY
JOSEFINA ARREOLA
RODRIGUEZ

NOMBRE DEL ALUMNO:
HECTOR ANTONIO FLORES
SANCHEZ

08 DE MARZO DEL
2025

ENFERMEDADES HEREDITARIAS

DISPLASIA DE CADERA

La displasia de cadera es una enfermedad ortopédica de desarrollo muy común en los perros asociada a una conformación anormal e inestabilidad de la articulación que da lugar a un gran dolor y disfunción.

TIPOS DE DISPLASIA

Displasia acetabular: consiste en un mal desarrollo del acetábulo.
Displasia de cuello femoral: es consecuencia del incremento en el ángulo que forma el cuello del fémur con la diáfisis femoral.

RAZAS CON PREDISPOSICIÓN GENÉTICA

Pastor Alemán, Boyero de Berna, Mastín, San Bernardo, Terranova, Rottweiler, Labrador Retriever, Golden Retriever, Boxer, Bulldog, Border Collie.

MENINGOENCEFALITIS

La meningoencefalitis es una patología neurológica que se diagnostica con frecuencia en la clínica de pequeños animales.

TRATAMIENTO

Antibiótico, Corticoides
Antiepilépticos Fluidoterapia La curación absoluta puede durar de 4-6 semanas aprox.

PREVENCIÓN

Vacunación en tiempo y forma Desparasitación Tratar de forma temprana infecciones del oído, oculares, nasales. Evitar ingestión de toxicidad.

HERNIA INGUINAL/PREPÚBICA

La hernia inguinal en perros se produce cuando a pared del anillo inguinal se ve deteriorada. Las hernias inguinales en los perros pueden aparecer desde el nacimiento del animal y ser congénitas. Durante la edad adulta son menos comunes aunque no imposibles.

TRATAMIENTO

Reducir el volumen de las heces. Verificar que no haga esfuerzos a la hora de defecar. Administrar una dieta baja en residuos y alta en fibra y contenido húmedo. Ablandadores de heces como laxantes

EJEMPLO

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit, dignissim taciti semper consequat pharetra himenaeos nam, hac ante ultrices aliquam praesent feugiat.

PROGNATISMO

ocurre cuando los dientes inferiores sobresalen enfrente de los dientes superiores. Si los dientes incisivos superiores e inferiores se juntan (o tocan) con las puntas.

SINONIMIA

Maloclusión esquelética Distocclusión, Mandibular, también llamada mordida superpuesta, braquignatismo mandibular

Existe un espacio entre los incisivos superiores e inferiores cuando la boca está cerrada. Los premolares superiores se desplazarán hacia la nariz, comparado con los premolares inferiores.

INFOGRAFIA

[HTTPS://WWW.FELLOW.DOG/ES/SALUD/ENFERMEDADES-HEREDITARIAS?UTM_SOURCE=CHAT9PT.COM](https://www.fellow.dog/es/salud/enfermedades-hereditarias?utm_source=chat9pt.com)