

UNIVERSIDAD DEL SURESTE



ENFERMEDADES PARASITARIAS

ESCOBAR CRUZ MARGARITA

MVZ ETY JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ

LIC EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ENFERMEDADES PARASITARIAS

tenia canina

Infección parasitaria causada por la presencia de tenias en el intestino de los perros. Estas parasitosis son causadas principalmente por dos géneros de tenias: *Dipylidium caninum* y *Taenia* spp.

signos

- Rascado o mordisqueo en el área anal
- Vómito
- Diarrea
- Dolor abdominal
- Pérdida de peso

tratamiento

- Desparasitante: Prazicuantel 5mg/kg
- Febendazol

Prevención

- Evitar la coprofagia
- Evitar carnes crudas
- Desparasitación regular
- control de pulgas

toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii es un protozoo intracelular y su principal huésped definitivo es el gato. La enfermedad que causa se llama toxoplasmosis. La transmisión ocurre de varias maneras:

1. Ingesta de ooquistes en alimentos o agua contaminada;
2. Consumo de carne cruda o mal cocida.
3. Transmisión vertical:

Signos clínicos

- Dolores musculares
- Fiebre
- Cansancio extremo
- Dolores de cabeza
- Linfadenopatía
- Abortos en embarazadas

Tratamiento

pirimetamina y sulfadiazina para eliminar el parásito del cuerpo.

Prevención

Chequear regularmente a los perros:

- Es importante realizar pruebas de diagnóstico regulares para detectar la enfermedad en sus etapas más tempranas

gusano del corazón

Enfermedad parasitaria grave que afecta a los perros, causada por el parásito *Dirofilaria immitis*. Este parásito es un gusano filiforme que se instala en el corazón y los pulmones de los perros

Signos

- Tos persistente:
- Dificultad para respirar:
- Fatiga y debilidad
- La falta de apetito
- Pérdida de peso:
- Hinchazón abdominal
- Colapso o desmayos

Tratamiento

El tratamiento para los gusanos del corazón puede ser largo y requiere atención veterinaria cuidadosa, dado que los gusanos adultos pueden causar daño significativo a los órganos del perro

glucocorticosteroides, diuréticos, vasodilatadores y fluidoterapia

babesia

son protozoos que afectan los glóbulos rojos en la sangre de los animales. El parásito puede causar hemólisis. El ciclo de vida de *Babesia* involucra a las garrapatas como huéspedes definitivos y los animales como huéspedes intermediarios.

Signos clínicos

- Fiebre
- Anemia
- Ictericia
- Debilidad
- Orina oscura
- Dificultad para respirar

Tratamiento

Antiprotozoarios:

- Se utilizan medicamentos como imidocarb dipropionato o diminazene aceturato para eliminar el parásito del cuerpo del animal.
- Antibióticos
- Terapia de líquidos y transfusión sanguínea

Bibliografía

<https://www.purina.com/es/articulos/perro/salud/sintomas/tenia-en-los-perros>

<https://www.msdmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/protozoos-extraintestinales/babesiosis?ruleredirectid=757>

https://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasma_gondii