



**MAPA CONCEPTUAL: “ENFERMEDADES PARASITARIAS EN CANINOS Y  
FELINOS”**

Gallardo Tejeda Frida Clarisa

M.V.Z. Arreola Rodríguez Ety Josefina

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Patología y Técnicas Quirúrgicas de Pequeñas Especies

Tapachula, Chiapas

15 de Febrero del 2025

# ENFERMEDADES PARASITARIAS EN CANINOS Y FELINOS

## Tricocéfalo.

¿Qué es?

Trichuris vulpis es un parásito que invade los intestinos de los perros. Tiene forma de látigo.

Signos clínicos.

Diarrea cólica.

Sangre fresca en las heces.

Anorexia.

Pérdida de peso.

Tratamiento.

Desparasitar (fenbendazol, moxidectina, pirantel, prazicuantel)

## Toxocara canis.

Gusano redondo intestinal que pertenece al filo de los Nematodos.

Se infectan al ingerir los huevos que contienen larvas infectadas.

Afecta principalmente a cachorros.

Es zoonótico.

Signos clínicos.

En cachorros provoca vómito, diarrea con lombrices.

Tratamiento.

Desparasitar (pirantel, fenbendazol)

Tipos de larvas en humanos.

Larva migratoria visceral.

Larva migratoria ocular.

## Tenia canina.

Parásito intestinal largo y plano que es frecuente en los perros.

La pulga y piojos actúan como hospedadores intermediarios.

Signos clínicos.

Suelen ser asintomáticos pero el animal infectado suele arrastrar el ano por el suelo.

Tratamiento.

Administrar prazicuantel.

## Babesia.

La babesiosis es la infección por especies del protozoo Babesia

La transmite la garrapata.

Especies: B. vogeli y B.gibsoni.

Signos clínicos.

Palidez en las mucosas

Taquicardia.

Debilidad.

Crisis convulsivas.

Tratamiento.

Depende de la cepa de Babesia que cause la enfermedad y puede incluir antiprotozoarios, transfusiones de sangre.

## Gusano del corazón.

Causada por el nematodo Dirofilaria immitis.

Es zoonótico.

Es transmitido por los mosquitos.

Signos clínicos.

Puede presentar: tos, pérdida de peso, letargia.

Tratamiento.

Consiste en administrar antiparasitarios.

## Toxoplasma gondii.

Infección causada por un parásito llamado Toxoplasma gondii.

Se puede transmitir al humano mediante el contacto con heces de gatos infectados o carne poco cocida.

Signos clínicos.

Los síntomas suelen pasar desapercibidos.

Tratamiento.

No hay fármacos autorizados para el tratamiento de la toxoplasmosis felina, en los casos agudos la clindamicina es el fármaco de elección.

## BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.msmanuals.com/es/hogar/infecciones/infecciones-parasitarias-nematodos-lombrices/infecci%C3%B3n-por-tricoc%C3%A9falos>
- <https://www.inst.es/agentes-biologicos-basebio/parasitos/toxocara-canis>
- <https://www.purina.com/es/articulos/perro/salud/sintomas/tenia-en-los-perros>
- <https://www.msmanuals.com/es/professional/enfermedades-infecciosas/protozoos-extraintestinales/babesiosis?ruleredirectid=757>
- <https://www.msmanuals.com/es/hogar/infecciones/infecciones-parasitarias-nematodos-lombrices/infecci%C3%B3n-por-el-gusano-del-coraz%C3%B3n-de-perro>
- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/toxoplasmosis/symptoms-causes/syc-20356249>