



SUPER NOTA DE SALMONELOSIS PORCINA

HERNANDEZ SOLORIO JOSE JULIAN

M.V. Z ETI JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

INTRODUCCION A LA CIRUGIA, PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE
PEQUEÑAS ESPECIES

Tapachula, Chiapas 14 de febrero del 2025

ENFERMEDADES PARASITARIA EN CANINOS Y

FEELINOS

TOXOCARA CANIS

una **lombriz parasitaria** que se localiza en el estómago y los intestinos del perro, donde puede alcanzar una longitud considerable de casi **20 centímetros**

SIGNOS CLINICOS

En los cachorros podríamos ver **vómitos y diarrea** intermitentes, con **expulsión de lombrices** con aspecto de espaguetis

TRATAMIENTO

Pirantel 5mg/kg VO
Piperazina 110 mg/kg VO
Fenbendazol 50mg/kg VO

TRIGOCÉFALO (TRICHURIS VULPIS)

son un parásito común que invade los intestinos de los perros. Producen una fuerte irritación del revestimiento de la pared intestinal, lo que genera una diarrea con sangre.

SIGNOS CLINICOS

Diarrea cólica (p. ej., tenesmo) aparición de moco y sangre fresca en las heces.
Anorexia
Pérdida de peso
Cólico
Anemia.

TRATAMIENTO

Desparasitar desde cachorros
Fenbendazol
Moxidectina
Imidacloprid
Febantel
Pirantel
Prazicuantel

TENIA CANINA

•Es un verme plano de perros y gatos. Las pulgas o los piojos masticadores del perro actúan como hospedadores intermediarios, y los perros y gatos pueden infectarse tras la ingestión de estos insectos.

SIGNOS CLINICOS

Las infecciones son asintomáticas, pero el paso de segmentos grávidos por el recto provoca una irritación que a menudo hace que el animal camine con las patas delanteras arrastrando el perineo contra el suelo para aliviar el prurito.

TRATAMIENTO

El tratamiento para la infección por *D. caninum* consiste en la administración de 5 mg/kg de prazicuantel

EQUINOCOCO (ECHINOCOCCUS GRANULOSUS)

•Son pequeños gusanos planos que tienen el cuerpo dividido en segmentos. Los adultos parasitan a los perros y a los gatos, y se alojan en el intestino delgado.
Su forma recuerda a las tenias clásicas o solitarias, pero son mucho más pequeños

DIAGNOSTICO

Debe estar basado en la anamnesis del animal; es decir, en su posible acceso a vísceras crudas. Los huevos rara vez se excretan en las heces

TRATAMIENTO

El prazicuantel por vía oral en dosis de 5 mg/kg.
Albendazol

GUSANO DEL CORAZÓN

Es un nematodo filarioide de los perros (y gatos) transmitido por mosquitos.

Es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca congestiva derecha, de neumopatía y de muerte en los perros

TRANSMISIÓN

Los
Intolerancia al ejercicio físico
Pérdida de peso
Letargia.
A medida que la enfermedad progresa pueden aparecer:
Disnea
Taquipnea
Hemoptisis
Taquicardia
Soplo cardíaco

TRATAMIENTO

Los perros que presenten signos clínicos intensos derivados de esta microfilariosis deben ser estabilizados, con medicación complementaria (glucocorticosteroides, diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos positivos y fluidoterapia).

BIOGRAFIA

<https://www.kivet.com/blog/tipos-parasitos-mascotas/>

<https://www.cvalboran.com/noticias/enfermedades-parasitarias-mascotas-preveccion/>