



ACTIVIDAD: CUADRO SINOPTICO

ANTONIO CRUZ BAUTISTA

MVZ. ETY JOSEFINA ARREOLA

INTRODUCCION A LA CIRUGIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

CUATRIMESTRE N°5

GRUPO A

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

TAPACHULA, CHIAPAS

ENFERMEDADES HEREDITARIAS

PEQUEÑAS ESPECIES

DIPLASIA DE CADERA

Existen varias opciones para el tratamiento de la displasia de cadera canina, incluyendo algunas opciones quirúrgicas, así como la gestión de la enfermedad a través de medicación

- La displasia de cadera es una enfermedad ósea, hereditaria, no congénita puesto que no se manifiesta en el nacimiento, sino que se desarrolla con el crecimiento de la pelvis y puede aparecer a partir de los cuatro o cinco meses de edad y, además, es degenerativa.

MENINGOENCEFALITIS

La meningoencefalitis, por su parte, suele deberse a infecciones de los oídos, los ojos o la cavidad nasal. Y la meningomielitis suele aparecer después de una discoespondilitis y una osteomielitis. En los cachorros y perros con el sistema inmunitario comprometido, estas infecciones suelen llegar al cerebro y a la médula espinal a través de la sangre.

- meningoencefalitis bacteriana no es frecuente en perros y no suele ser contagiosa. Los signos habituales de la meningitis son fiebre, dolor y rigidez del cuello y espasmos musculares dolorosos. Los perros pueden tener estos signos sin ningún signo de disfunción cerebral o de la médula espinal.

HERNIA PERINEAL

Las hernias perineales no tratadas pueden provocar varias complicaciones, entre ellas: Obstrucción intestinal: El atrapamiento de segmentos intestinales dentro del saco herniario puede provocar una obstrucción que requiera atención médica urgente.

- Estas hernias son más comunes en machos y pueden ser causadas por una debilidad en el músculo o tejido del perineo, una lesión o una enfermedad. Los signos clínicos pueden incluir un bulto en la zona perineal, dificultad para defecar u orinar y dolor.

PALADAR HENDIDO

Existen muchas causas para el labio leporino y el paladar hendido. Problemas con los genes que se transmiten de uno o ambos padres, drogas, virus u otras toxinas; todo esto puede causar estos defectos congénitos. El labio leporino y el paladar hendido pueden ocurrir junto con otros síndromes o anomalías congénitas.

- El paladar hendido congénito es una comunicación anormal entre las cavidades oral y nasal, que se produce como consecuencia de un cierre incompleto de estructuras durante el desarrollo embrionario. Puede clasificarse a su vez en primario o secundario.

LINKOGRAFIA

[displasia de cadera perros - Buscar con Google](#)

[meningoencefalitis en perros - Buscar con Google](#)

[hernia perineal perro - Buscar con Google](#)

[paladar hendido perro - Buscar con Google](#)