



Arreola González Jesús Reveriano

Ety Josefina Arreola Rodríguez

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Veterinaria y Zootecnia

Patología y técnicas quirúrgicas de pequeñas especies

Tapachula, Chiapas

29 de Marzo del 2025

Fracturas en caninos

Son lesiones comunes en perros que ocurren cuando un hueso se rompe o se agrieta. Pueden ser causadas por accidentes, caídas o peleas con otros animales.

Fractura Oblicua

Es una rotura diagonal del hueso que forma dos fragmentos óseos con extremos puntiagudos.

Tratamiento:

- Se pueden usar férulas externas o escayolas para tratar fracturas incompletas en perros jóvenes y sanos.




Fractura espiroidea

Es una rotura ósea que se produce en espiral alrededor del hueso. Suelen ser causadas por fuerzas torsionales.

Tratamiento:

- En fracturas no desplazadas, se puede restringir la actividad del perro y administrarle analgésicos y antiinflamatorios



Fractura expuesta

Es una lesión ósea que rompe la piel y deja el hueso expuesto. También se le conoce como fractura abierta.

Tratamiento:

- Detener el sangrado con presión directa sobre la herida
- Evitar mover la zona lesionada
- Usar antibióticos para prevenir infecciones




Fractura transversal

Es una rotura que se produce en línea recta a través del hueso, formando un ángulo perpendicular al eje longitudinal del hueso.

Tratamiento:

- Inmovilizar la extremidad afectada con una férula o un yeso
- Cirugía para reparar el hueso



Fractura conminuta

Es un tipo de fractura en el que un hueso se rompe en más de dos fragmentos. También se le conoce como fractura multifragmentaria.

