



UNIDAD 4. Realizar un mapa conceptual sobre las enfermedades en conejos (en base a la exposición)

Alumna:

ANDRES GUTIERREZ JENNIFER ALONDRA

Docente:

MVZ. Arreola Rodríguez Eti Josefina

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura:

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

M.V.Z.

Materia:

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE AVES Y CONEJOS

Fecha de entrega:

30 de Marzo del 2025

ENFERMEDADES EN CONEJOS

ENCEFALITOOZONOSIS

Causada por:

Encephalitozoon cuniculi (parásito intracelular protozoario)

Transmisión

-Ingestión o inhalación de esporas presentes en la orina de conejos infectados
-Madre a las crías a través de la placenta

Tratamiento

Se administra fenbendazol y antiinflamatorios para reducir la inflamación. **No hay una cura definitiva**

Signos y lesiones

Puede causar signos neurológicos (**incluyendo inclinación de la cabeza, pérdida de equilibrio, convulsiones y parálisis**), daño renal (**insuficiencia renal crónica**) y lesiones oculares (**cataratas o uveítis**).

Control

Evitar el contacto con conejos infectados, mantener una higiene adecuada y realizar pruebas serológicas en criaderos.

PODODERMATITIS

Causada por:

Lesiones inflamatorias en la piel de las patas traseras debido a presión prolongada o infección bacteriana (Staphylococcus aureus en muchos casos)

Transmisión

No es contagiosa, pero ocurre por condiciones ambientales inadecuadas (suelos duros, jaulas con rejillas, obesidad, falta de higiene).

Signos y lesiones

Ulceraciones en las plantas de los pies, inflamación, dolor y cojera.

Tratamiento

Mantener las patas limpias y secas, aplicar antibióticos tópicos y orales si hay infección, y mejorar las condiciones del suelo de la jaula con superficies acolchonadas.

Control

Uso de sustratos adecuados, control del peso del conejo y revisiones periódicas de las patas.

TOXEMIA DE LA PREÑEZ

Causada por:

Alteraciones metabólicas debido a un desequilibrio energético en hembras preñadas, especialmente en conejas obesas o con estrés.

Transmisión

No es contagiosa

Tratamiento

Administración de fluidos intravenosos, corrección de desequilibrios electrolíticos y suministro de energía (glucosa)

Signos y lesiones

Letargo, debilidad, dificultad para moverse, convulsiones y en casos graves, muerte súbita

Control

Alimentación equilibrada en hembras gestantes, evitar la obesidad y reducir el estrés

PAPILOMATOSIS

Causada por:

Virus del papiloma en conejos (Rabbit Papillomavirus).

Transmisión

Contacto directo con animales infectados o superficies contaminadas

Tratamiento

La mayoría de las veces, desaparece espontáneamente, pero en casos persistentes o problemáticos, se pueden eliminar quirúrgicamente

Signos y lesiones

Verrugas en la piel o en la boca. Pueden ser pequeñas o grandes, y en algunos casos, evolucionar a tumores malignos.

Control

Higiene, evitar el contacto con conejos infectados y desinfectar jaulas y utensilios.