



MAPA CONCEPTUAL ENFERMEDADES EN CONEJOS

HERNANDEZ SOLORIO JOSE JULIAN

M.V. Z ETI JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia

PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE AVES Y CONEJOS

Tapachula, Chiapas 29 de marzo del 2025

ENFERMEDADES EN CONEJOS

ENCEFALITOOZONOSIS

es una enfermedad causada por el parásito intracelular *Encephalitozoon cuniculi*, un microsporidio que afecta el sistema nervioso, los riñones y, en algunos casos, los ojos

SÍNTOMAS EN CONEJOS

- Cabeza inclinada (tortícolis o síndrome vestibular).
- Ataxia (problemas de equilibrio y coordinación).
- Convulsiones o movimientos involuntarios.
- Parálisis parcial o total en extremidades.

TRATAMIENTO

antiparasitarios:

- Fenbendazol (20 mg/kg/día por 28 días) es el tratamiento más utilizado.
- Albendazol, aunque menos recomendado por su posible toxicidad.

PREVENCION

Mantener un ambiente limpio y desinfectado.

- ✓ Evite el contacto con conejos infectados o su orina.
- ✓ Ofrecer una dieta equilibrada y reducir el estrés.

CHEYLETIELOSIS

también conocido como el "ácaro de la caspa ambulante". Este parásito vive en la piel del conejo y se alimenta de queratina, provocando descamación y picazón.

SÍNTOMAS EN CONEJOS

- Caspa o descamación en la zona del lomo, cuello y espalda.
- Pérdida de pelo (alopecia) en áreas afectadas.
- Irritación y enrojecimiento de la piel.
- Prurito (picazón intensa), aunque algunos conejos no se rascan.

TRATAMIENTO

- ivermectina (subcutánea o oral, según indicación veterinaria).
- Selamectina (tópica, aplicada en la piel).
- Moxidectina (en algunos casos).

PREVENCION

Revisar periódicamente la piel y el pelaje del conejo.

- ✓ Mantener una higiene adecuada del hábitat.
- ✓ Evitar contacto con animales infectados.
- ✓ Control veterinario periódico

BUFTALMIA

es una condición ocular caracterizada por un aumento anormal del tamaño del globo ocular debido a la acumulación excesiva de líquido intraocular.

SÍNTOMAS EN CONEJOS

- Agrandamiento del ojo de manera progresiva.
- Pérdida de visión (puede ser parcial o total).
- Opacidad corneal.
- Enrojecimiento ocular.
- Dolor ocular (aunque los conejos suelen ocultar el dolor).

TRATAMIENTO

- Fármacos hipotensores oculares: Dorzolamida o timolol pueden ayudar a reducir la presión intraocular.
- Analgésicos y antiinflamatorios: Meloxicam o AINES para controlar el dolor y la inflamación.

PREVENCION

- Revisión oftalmológica periódica en conejos predisuestos.
- Evitar traumatismos en el área ocular.
- Control de infecciones parasitarias.

TOXEMIA DE LA PREÑEZ

La toxemia de la preñez, también conocida como cetosis de la gestación, es una afección metabólica grave que afecta a conejas gestantes, especialmente en la última semana de gestación o durante los primeros días posparto.

SÍNTOMAS EN CONEJOS

- Falta de apetito (anorexia).
- Letargo o debilidad.
- Disminución en la producción de heces.
- Síntomas avanzados: Respiración rápida y dificultosa.
- Convulsiones o temblores musculares.

TRATAMIENTO

- Analgésicos como meloxicam para aliviar el malestar.
- Suplementos energéticos (como jarabe de glucosa).

PREVENCION

- Acceso continuo a agua y alimento:
- Nunca restringir el alimento en la última semana de gestación.
- Reducción del estrés:
- Minimizar cambios bruscos en el entorno y evitar manipulación excesiva.

BIBIOGRAFIA

<https://www.tiendanimal.es/articulos/enfermedades-de-los-conejos/>

<https://arquivet.com/es/blog/roedores/cuales-son-las-principales-enfermedades-de-los-conejos>