



Cuadro sinóptico
Enfermedades preventivas en
caninos y felinos

Tamayo Santos Iranis

Méd. Arreola Rodríguez Ety
Josefina

Patologías y técnicas quirúrgicas
de pequeñas especies

Universidad del sureste Medicina
veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. 25.Ene. 2025

BIBLIOGRAFÍA

https://www.tiendanimal.es/articulos/salud-prevencion-enfermedades-gatos/?srsId=AfmBOooYFqDoELpHJHhNwgxHEpaq-6zpyzP5bzpn3W1_hH6SeCT2Zkme

<https://paot.org.mx/adoptacdmx/medicina.php>

Enfermedades preventivas en caninos y felinos

Rabia

Virus mortal que se transmite a las personas mediante la saliva de animales infectados
En los perros, la rabia afecta principalmente al cerebro, provocando una encefalitis aguda

El tratamiento consiste en medidas preventivas
No hay un tratamiento específico para la rabia. Una vez que aparecen los síntomas, casi siempre es fatal.
Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, exceso de salivación, espasmos musculares, parálisis y confusión mental

vacuna antirrábica
La primera dosis se aplica a partir del primer mes de edad
Se aplica un refuerzo a los tres meses
A partir de entonces, se aplica una revacunación anual

Parvovirus

El parvovirus canino es una enfermedad vírica que ataca principalmente el sistema digestivo, causando enteritis severa (inflamación del intestino)

los primeros síntomas son caracterizados por letargia, fiebre, inapetencia, vómitos, deshidratación y diarreas sanguinolentas
Tratamiento
El tratamiento del parvovirus canino se centra en controlar los síntomas, ya que no existe un medicamento que elimine directamente el virus

En la forma entérica, la diarrea generalmente aparece de 6 a 24hs de los primeros síntomas y el vómito puede o no estar presente.
Prevención
vacunar a los cachorros. La vacuna CPV-2 es una de las vacunas esenciales para perros.

Distemper

es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral de alta mortalidad.
afecta el aparato respiratorio y digestivo, aunque en casos avanzados también afecta el sistema nervioso.

Signos clínicos
Fiebre, Secreción nasal, Tos, Letargo
Pérdida de apetito, Vómito, Diarrea, Movimientos en círculo
Inclinación de la cabeza, Convulsiones
Prevención
se recomienda vacunar a los cachorros cada 3 a 4 semanas entre las 6 y 16 semanas de edad.
Un año después de la última dosis, se debe aplicar una dosis de refuerzo.

Tratamiento
Tratamiento con antibióticos para controlar las infecciones bacterianas, pero las probabilidades de curar el moquillo en perros son bastante escasas en la mayoría de casos

Hepatitis

enfermedad viral que afecta a los perros y que se caracteriza por provocar inflamación del hígado y otros síntomas.

Transmisión
Se transmite por la ingestión de heces, saliva u orina de perros infectados.
Tratamiento
No hay un tratamiento específico pero los síntomas se pueden tratar con:
• Fluido terapia
• tratamiento antibiótico para evitar las infecciones bacterianas secundarias
• Antiinflamatorios, Anticoagulante

Signos clínicos
Hígado agrandado y doloroso
Ictericia
Hemorragias en las encías
Mucosas pálidas o amarillentas
• Fiebre
• Letargo
• Diarrea
• Vómitos
• Dolor abdominal

Prevención
La hepatitis canina se puede prevenir con una vacunación adecuada. La vacuna contra la hepatitis es parte de la primera tanda de vacunación de los cachorros.

Leptospirosis

Enfermedad infecciosa bacteriana.
Es potencialmente mortal y puede causar daños renales que persistan incluso después de la recuperación.

Signos clínicos
• Ictericia
• Hemorragias Petequiales o equimóticas
• Hígado y riñones aumentados de tamaño
• Pulmones húmedos, pesados y descoloridos
Tratamiento
• La doxiciclina es el fármaco de elección para eliminar la bacteria.
• El tratamiento debe ser lo más pronto posible.

Diagnóstico
• Análisis de sangre y orina
• y mediante signos clínicos
Prevención
• Vacunar a los perros
• Evitar el contacto con aguas estancadas y roedores
• Mantener la higiene del perro y de su entorno

Leucemia felina

El VLF se transmite hacia los gatos no infectados a través de la saliva o las secreciones nasales. Este virus causa un tipo de cáncer de las células sanguíneas, los linfocitos.

Signos clínicos
Infecciones de la piel, infecciones de las vías respiratorias superiores, alteraciones gastrointestinales, convulsiones, diarrea, dolor, pérdida de piezas dentales, ictericia, gingivitis, estomatitis
Prevención
• La vacuna contra el virus de la leucemia felina (FeLV)
• Evitar el contacto con otros gatos
• Antes de vacunar al gato, es importante comprobar que no esté infectado

Diabetes felina

es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de glucosa en la sangre. Se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando los tejidos no responden a la insulina.

Signos clínicos
• Caminar de forma irregular, Letargia
• Infecciones recurrentes en el tracto urinario
• Aumento de la sed, Pérdida de peso
• Pelaje deteriorado, poliuria

Tratamiento
• Dieta
• Administración de Insulina
Prevención
• evitar el sobrepeso y proporcionarles una dieta adecuada y ejercicio físico.

Rabia felina

La rabia en gatos es causada por el virus del género Lyssavirus, afecta al sistema nervioso central de los gatos, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios

Signos clínicos
Irritabilidad, Mordidas continuas, Parálisis, Encefalitis, Desorientación, Espasmos musculares, Hipersalivación, Maular continuamente
No existe tratamiento específico

Prevención
Vacuna preventiva contra la rabia a los tres meses de nacidos y posteriormente cada año