



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Roblero Hernandez Ericka Janeth

**PATOLOGIA Y TECNICAS QUIRURGICAS DE
PEQUEÑAS ESPECIES**

25/01/25

**ETI JOSEFINA
ARREOLA RODRIGUEZ**

Lic. Medicina Veterinaria y Zootecnia

Tapachula Chiapas

Enfermedades Preventivas

Parvovirus

Esta es una infección causada por un virus grave contagioso que afecta el tracto gastro intestinal del perro

Los agentes etiológicos provienen de la familia parvoviridae que son virus muy resistentes a sustancias como el éter cloroformo

Lamentablemente no hay cura para este virus los tratamientos comunes serían hidratación del perro

Esta enfermedad no solo afecta a los cachorros recién nacidos sino que también puede haber probabilidad de infectar a perros mayores

Sus principales síntomas son la fiebre, inflamación del tejido cardíaco, anorexia, vómito y el más descartable a parvovirus es la diarrea con sangre

Esta influye mucho en las paredes intestinales lo cual ocasiona que carcoman esas paredes y provocar un sangrado interno al perrito por eso ocasiona las diarreas con sangre

Los perros al tener el parvo suelen deshidratarse mucho debido a mucho vómito y diarrea

Las muertes ocasionadas por parvovirus ocurren dentro de 48 o 72 horas.

Los felinos también presentan lo mismo pero proveniente de una variante diferente

Coronavirus

Es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los perros jóvenes, causando síntomas graves como diarrea y vómitos.

Su principal propósito será afectar al sistema respiratorio del perro y parte del sistema digestivo.

Las esporas del virus pueden entrar al sistema respiratorio del perro por lo que lo puede llevar al sistema digestivo afectando a los intestinos

Las variantes de estas son 2 pero en parte provoca vómito o afecta las mismas zonas mencionadas

principalmente a los perros jóvenes, causando síntomas graves como diarrea y vómitos.

La transmisión de este puede ser de manera efectiva olfateando las heces de algún perro y de vía oral

Su periodo de incubación es de 24 h y los síntomas se ven a los 8 o 10 días

Distemper canino

Es una de las enfermedades más mortales en caninos después del parvovirus

Es un miembro del género morbillivirus de la familia Paramixoviridae

La vacunación es la mejor forma de prevenir el distemper canino.

Hay casos en los que el distemper puede jugar una jugada de doble filo por su manera de contagiar, a veces los perros pueden parecer que estuvieran sin ninguna enfermedad pero están infectados por este virus y es una de las maneras más comunes de infectar a cachorros

Es una de las enfermedades altamente contagiosas y en muchos casos mortal

Se recomienda vacunar a los perros adultos una vez al año

Bibliografía:

<https://purina.com.mx/purina/perros/parvovirus-canino>
<https://www2.zoetis.cl/productos-y-soluciones/caninos/distemper>