



Mapa conceptual
enfermedades parasitarias en
caninos

Tamayo Santos Iranis

Méd. Arreola Rodriguez Ety
Josefina

Patología y técnicas quirúrgicas
de pequeñas especies

Universidad del sureste Medicina
veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. 15.feb. 2025

Enfermedades parasitarias en caninos

son patologías causadas por parásitos que viven en el organismo del animal

Dirofilariosis

causada por la presencia de gusanos del género *Dirofilaria* en el corazón y los vasos sanguíneos de los perros.

Signos clínicos

- Toser
- Fatiga
- Pérdida de peso
- Problemas cardíacos
- Síncope
- hemoptisis
- Dificultad para respirar

Tratamiento

- deben ser estabilizados, con medicación complementaria
- glucocorticosteroides
 - diureticos
 - Vasodilatadores
 - fluidoterapia

Gusano del esófago

Signos clínicos

- Etapa 1 pueden permanecer asintomáticos
- Etapa 2 la infección puede evolucionar y provocar regurgitación
- La migración de larvas a la aorta puede producir una pleuritis causante de tos, arcadas y disnea

Tratamiento

- Milbemicina en dosis orales de 0,5 mg/kg
- Doramectina por vía subcutánea
- Moxidectina más imidacloprid por vía tópica.

Ancylostoma

Nombre común: Gusano anquilostoma o gusano de la uncinaria

Hospedador: Perros y otros cánidos

Vía de los adultos: Intestino delgado

Período de prepatencia

(aproximadamente 1-2 meses)

Via de trasmisión

Penetración de larvas a través de la piel o ingestión de huevos infectados

Signos clínicos

- Cutáneos
 - 1. Dermatitis
 - 2. Pústulas
 - 3. Eritema
- Intestinales
 - 1. Diarrea
 - 2. Vómitos
 - 3. Dolor abdominal
 - 4. Pérdida de peso
- Respiratorios
 - 1. Tos
 - 2. dificultad para respirar

Tratamiento

- Fenbendazol en dosis de 50 mg/kg al día
- Solución tópica de unción puntual con imidacloprid al 10% y moxidectina al 2,5%

Toxocara canis

Alcanza una longitud de 20 cm

lombriz parasitaria que se localiza en el estómago y los intestinos del perro

T. canis es zoonótico

T. Canis no suele provocar ningún síntoma en perros adultos

Signos clínicos (cachorros)

- 1. diarrea
- 2. vómitos
- Los cachorros con graves infestaciones no crecen
- abdomen hinchado con dolor a la palpación y anemia.
- expulsión de lombrices con aspecto de espaguetis

Tratamiento

- Pirantel 5mg/kg VO
- Piperazina 110 mg/kg VO
- Fenbendazol 50mg/kg VO

Tricocéfalo

(*trichuris vulpis*) parásito común que invade los intestinos de los perros.

Signos clínicos

- aparición de moco y sangre fresca en las heces.
- Anorexia
- Pérdida de peso
- Cólico
- anemia

Tratamiento

- Fenbendazol
- Moxidectina
- Imidacloprid
- Desparasitar desde cachorros
- Febantel
- Pirantel
- Praziquantel

Hospedadores intermediarios

- Pulgas
- piojos

Taenia canina

(*Dipylidium caninum*)

Signos clínicos

- Irritación
- prurito

Diagnóstico

El diagnóstico puede hacerse mediante la anamnesis y los signos clínicos

Tratamiento

administración de 5 mg/kg de praziquantel

Control

El control se logra manteniendo a los perros y los gatos sin pulgas y piojos

• Es un verme plano de perros y gatos

Bibliografía

<https://www.redalyc.org/journal/5600/560062814003/html/>

<https://www2.zoetis.es/productos-y-soluciones/perros/parasitos-internos-en-perros>

<https://www.anicura.es/consejos-de-salud/perro/consejos-de-salud/parasitos-intestinales-en-el-perro/>