



MAPA CONCEPTUAL

PATOLOGÍA DE PEQUEÑAS ESPECIES

Luisana Arévalo cruz

MED. ETY

Universidad del sureste

Medicina veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. Sábado 15 de
febrero del 2025

ENFERMEDADES PARASITARIAS EN CANINOS

ANCYLOSTOMA

Son nemátodos que infectan a los cánidos y félidos tanto domésticos como silvestres.

Infectan con las larvas envasadas de tercer estadio, que penetran por vía cutánea, oral o transmamaria y es zoonótica.

DIAGNÓSTICO

La detección de huevos se realiza mediante flotación fecal estándar con una solución salina saturada.

TRATAMIENTOS

Solución tópica de unction puntual con imidacloprid al 10% y moxidectina al 2,5% / Fenbendazol en dosis de 50 mg/kg al día Ivomectina subcutánea

CICLO BIOLÓGICO

Tiene un ciclo de vida complejo. Tras la eliminación de los huevos en las heces, las larvas se desarrollan en su interior y eclosionan en 2 a 9 días.

TOXOCARA CANIS

Es una lombriz parasitaria que se localiza en el estómago y los intestinos del perro, donde puede alcanzar una longitud considerable de casi 20 centímetros.

Los animales se infectan al ingerir los huevos que contienen larvas infectivas.

TRATAMIENTOS

Piperazina 110 mg/kg VO
Fenbendazol 50mg/kg VO
Pirantel 5mg/kg VO

La **larva migratoria visceral (LMV)**, múltiples lesiones en el hígado, o nódulos subpleurales poco definidos en el tórax.

La larva migratoria ocular, la experiencia en oftalmología es esencial para el diagnóstico.

TRICOCÉFALO

Es un parásito del perro que se encuentra además en zorros y coyotes. Las infecciones masivas pueden provocar signos de diarrea cólica.

son un parásito común que invade los intestinos de los perros.

DIAGNOSTICO

Se realiza por visualización de los huevos característicos.

SIGNOS CLÍNICOS

- Diarrea cólica
- aparición de moco y sangre fresca en las heces.
- Anorexia
- Cólico
- Anemia

TRATAMIENTO

- Desparasitar cachorros desde
- Fenbendazol
- Moxidectina
- Imidacloprid
- Febantel
- Pirantel
- Prazicuantel

DIROFILARIA

Causada por la presencia de gusanos del género *Dirofilaria* en el corazón y los vasos sanguíneos de los perros.

VIA DE TRANSMISION
Picadura del mosquito infectado.

SIGNOS CLÍNICOS

- Toser
- Fatiga
- Síncope
- hemoptisis
- Problemas cardiacos

TRATAMIENTO

- Vasodilatadores
- fluidoterapia
- diuréticos