CUADRO SINÓPTICO

PATOLOGÍA DE EQUINOS

Luisana Arévalo cruz

MED. Lourdes

Universidad del sureste

Medicina veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. Sábado 29 de marzo del 2025

Enfermedades de reporte obligatorio en equinos

Anemia infecciosa equina

Es una enfermedad vírica crónica, exclusiva de los équidos y transmitida habitualmente por artrópodos

Tratamiento

No existe un tratamiento ni una vacuna para la anemia infecciosa equina, Los caballos infectados deben ser aislados, puestos en cuarentena o sacrificados.

SINTOMAS

- Fiebre
- Anemia
- Edema en las extremidades y pecho
- Debilidad
- Depresión
- Pérdida de peso
- Respiración acelerada
- Diarreas
- Enrojecimiento de los ojos
- Ictericia

Transmisión

Se transmite por la picadura de insectos y por objetos contaminados con sangre infectada

Prevención

- Realizar chequeos serológicos a los animales que ingresan al predio
- Exigir un certificado negativo de AIE a los animales que ingresan
- Aislar y cuarentenar a los animales infectados

Gripe equina

Enfermedad causada por cepas de influenza A que son enzoóticas en las especies de caballos.

Tratamiento

Aislar al animal, darle reposo y administrarle antiinflamatorios y antibióticos.

SINTOMAS

- Fiebre de 39° a 41° C
- Tos seca y dolorosa
- Descarga nasal mucopurulenta
- Pérdida de apetito
- Fatiga
- Moqueo

Transmisión

Setransmite por contacto con animales infectados, por el aire, o por objetos contaminados.

Prevención

La vacunación frente a Influenza Equina es esencial para el control de la enfermedad.

Encefalomielitis

Enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los equinos, los humanos y las aves.

SINTOMAS

Fiebre, Anorexia, Depresión, Ataxia, Incoordinación, Decúbito, Hiperexcitabilidad, Ceguera, Convulsiones.

Prevención

- En caso de confirmarse un caso de EE, es importante aislar al animal y limpiar la zona.
- Se recomienda que se inmunice al personal frente a los virus EEE y EEO.

Metritis

Enfermedad bacteriana que afecta a los caballos.

SINTOMAS

- En las hembras, puede causar endometritis, cervicitis, vaginitis, descarga vaginal mucopurulenta e infertilidad temporal.
- En los machos, no produce signos clínicos.

DIAGNOSTICO

Se realiza mediante cultivo bacteriano de muestras tomadas de los sitios accesibles.

TRATAMIENTO

Lavados con clorhexidina y aplicación de pomadas con nitrofurazona al 0,2%.

Prevención

- Tomar muestras previa al inicio de la temporada reproductiva para conocer el estatus del animal.
- Lavar la fosa del clítoris y las cavidades.
- Suspender el apareamiento de animales infectados.