



**CUADRO SINÓPTICO**  
**PATOLOGÍA DE EQUINOS**

**Luisana Arévalo cruz**


**MED. LOURDES**

**Universidad del sureste**

**Medicina veterinaria y zootecnia**

**Tapachula, chis. Sábado 15 de  
febrero del 2025**

# PODODERMATITIS EQUINA



## QUE ES

La pododermatitis es una dermatitis crónica que afecta a las pezuñas de los caballos. Se caracteriza por inflamación, exudación, úlceras, costras y hinchazón en las patas.

## TRANSMISION

La pododermatitis equina es una dermatitis seborreica crónica que no se transmite entre caballos. Sin embargo, puede ser causada por bacterias que se encuentran en el ambiente.

- Causas
- Lesiones en la piel, como cortes, contusiones, heridas punzantes o abrasiones.
  - Infecciones por bacterias como *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.
  - Caballerías poco higiénicas.

- Factores de riesgo
- Caballos pesados, como los de tiro.
  - Caballos alérgicos a las picaduras de insectos.
  - Caballos que comen plantas tóxicas o resabientos de insectos a moho.
  - Caballos que reciben mordeduras de serpientes o toman medicamentos como corticoides.

## SIGNOS

El signo clínico de esta enfermedad es que los animales cojean y al examen hay dolor y calor, comúnmente al inicio de la estación de lluvias; es imprescindible revisar con cuidado a estos animales que alertan sobre el inicio de la enfermedad.

- Signos:
- Claudicación (en varios grados) a veces imperceptible y en ocasiones limita el movimiento e impide que el animal se desplace y coma.
  - Dolor.
  - Inflamación.
  - Penetrante olor putrefacto.

## ETIOLOGIA

Se han aislado agentes infecciosos como bacterias anaerobias, virus, espiroquetas y hongos de los tejidos enfermos.

- Prevención
- Arreglo del drenaje y uso de pisos.
  - Se requiere cama limpia y seca, retirar constantemente el estiércol y restos de forraje.
  - El uso de pediluvios ha dado buen resultado, así como el uso de tapetes sanitarios.

- Alergias
- La alergia a los Culicoides es una de las causas más comunes.
  - La fotosensibilidad puede causar dermatitis en caballos.

- Microorganismos
- Infestaciones por microorganismos.
  - Infecciones por bacterias como *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*), *E. coli* y *Pseudomonas*.

## TRAMIENTO

El tratamiento de la pododermatitis equina puede incluir antibióticos, terapia láser, y lociones tópicas.

- Antibióticos
- Se pueden usar antibióticos sistémicos para controlar la bacteria causante de la pododermatitis.
  - Se pueden aplicar antibióticos tópicos.

- Terapia láser
- La terapia láser puede ayudar a disminuir el dolor, controlar la inflamación, y estimular la piel.
  - Se pueden usar protocolos específicos para caballos, dependiendo del área de tratamiento.

**<https://hospitalveterinariobenipeixcar.es/manejo-de-la-pododermatitis-pies-humedos-en-caballos/>**

**<https://mx.virbac.com/enfermedades/pododermatitis#:~:text=El%20signo%20cl%C3%ADnico%20de%20esta,el%20inicio%20de%20la%20enfermedad>**

**<https://www.msdrvvetmanual.com/es/sistema-musculoesquel%C3%A9tico/cojeras-en-caballos/pododermatitis-en-caballos>**

**[https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as\\_sdt=0,5&q=pododermatitis+equina#d=gs\\_qabs&t=1739559726248&u=%23p%3DbFr-ognKoroj](https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0,5&q=pododermatitis+equina#d=gs_qabs&t=1739559726248&u=%23p%3DbFr-ognKoroj)**