

- Tratamiento
  - Antitoxinas
  - Terapia Paliativa
- Dx diferencial
  - Sindrome de Lamberts-Eaten
  - S. Guillain-Barre
  - Miastenia
- Disfagía
- Parálisis Flácida

Botulismo

- Signologia
  - Disminución de la reacción ocular
  - Reducción de tono muscular en secciones de la cara
  - Disfagia
- Agente Etiologico
  - Clsotridium Bolulinum
- Sinonimia
  - Alantiasis

- Diagnostico
  - Historia clínica
  - Exámen Clínico
- Sinonimia
  - Mancha, Pierna negra, Marriña Negra, Gangrena enfisomatosa
- Agente etiologico
  - Clostridium Chauvei
    - Gram+, anaerobio estricto, móvil, no capsulado, espeso central o terminal

Carbón Sintomatico

- Tratamiento
  - Penicilina 40mg/Kg
    - Vacuna inmediata y Revacunado de 15-21 días
- Signologia
  - Producción de inflamación musculares haciendo que el tejido se debilite, Depresión, Fiebre, Apetito disminuido, Cojera, tumefacciones en la área afectada
- Diagnostico
  - Improntas de Músculo
  - Porción de músculo con

Enfermed primera u

- lesión
- Dx DIferencial
  - Edema Maligno, Carbunco, electrocutación, Meteorismo
- SInonimia
  - AEO
- Agente Etiologico
  - Chlamydia Abortus
    - Chlamydiaceae
      - Intracelular obligatoria, gram -
    - Felis, Pneumoniae

Presented with xmind

ades
nidad

Clamidiosis

- Patología
  - Afecta a hembras en las 2-3 semanas de gestación
  - Mortinatos y placentas débiles
  - No sobreviven a más de 2 días los que llegan a nacer
- Signos clínicos
  - Provoca Brote de abortos, flujo vaginal marrón-rojizo durante varios días como fuente de infección
- Dx diferencial
  - Brucellosis Coxielosis
- Tratamiento
  - Tetraciclina, Eritromicina,

Quinolonas

- Diagnostico
  - Pruebas serológicas

Enterotoxen

- Diagnositco
  - Necropsia
- Dx Diferencial
  - Empacho, Enfermedad del riñón pulposo, disentería de los corderos, enteritis
- Tratamiento
  - Antitoxinas orales o inyección y antibioterapia
    - Se prefiere prevención

mia Infecciosa

- Signos Clínicos
  - Decaímiento, Fiebre, incoordinación, Diarrea, Convulsiones, muerte
- Sinonimia
  - E. de la sobrealimentación
- Agente Etiologico
  - C.Perfringens
    - Tipo D, Bacilos largos, gram +, catalasa -. Inmóviles anaerobios, fermentivos y forman esporas

Edema Maligno

- Sinonimia
  - Gangrena Gaseosa Flemón Séptico
- Agente Etiologico
  - Clostridium septicum
- Patogenia
  - Entrada de el agente a heridas recientes
- Signos Clínicos
  - Deacaímiento, Falta de apetito, cojera, músculos negros o necr



Diagnostico

Frotis del tejido, Visual

Dx Diferencial

Pierna Negra

Fiebre,
osados