



NOMBRE DEL ALUMNO: KARLA JULISSA MORALES MORENO

NOMBRE DEL TEMA: RCP BASICA

PARCIAL: 2

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA CLINICA II

NOMBRE DEL PROFESOR: MARCOS JHODANY ARGUELLO GALVEZ

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 5TO

1 CONFIRMAR LA SEGURIDAD DE LA ESCENA

- ## 2
- COMPRENDER SI LA VICTIMA RESPONDE
 - PEDIR AYUDA EN VOZ ALTA A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA.
 - ACTIVAR EL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS A TRAVES DE UN DISPOSITIVO MOVIL (SI ES POSIBLE)
 - OBTENER UN DEA Y EQUIPO PARA EMERGENCIAS (O ENVIAR A OTRA PERSONA PARA QUE LO TRAIGA).

3A

CONTROLAR HASTA QUE LLEGUE LOS REANIMADORES DE EMERGENCIAS.

LA RESPITACION ES NORMAL: SE DETECTA PULSO

3

COMPROBAR SI LA VICTIMA NO RESPIRA O SOLO JADEA/BLOQUEADA Y COMPROBAR EL PULSO (AL MISMO TIEMPO) ¿SE DETECTA PULSO CON CERTEZA AL CABO DE 10 SEGUNDOS?

LA RESPIRACION ES ANORMAL: SE DETECTA PULSO

3B

PROPORCIONAR VENTILACION DE RESCATE: REALIZAR UNA VENTILACION CADA 6 SEGUNDOS O 10 VENTILACIONES POR MINUTO

- COMPROBAR EL PULSO CADA 2 MINUTOS SI NO HAY PULSO, SE DEBE INICIAR LA RCP
- SI SE SOSPECHA LA PRESENCIA DE SOBREDOSIS DE OPIACEOS, ADMINISTRAR NALOXONA SI ESTA DISPONIBLE SIGUIENDO EL PROTOCOL.

NO HAY RESPIRACIONES O SOLO HAY JADEOS/BLOQUEOS; NO SE DETECTA PULSO

EN ESTE PUNTO, EN TODOS LOS ESCENARIOS, SE ACTIVA EL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS O LA ASISTENCIA Y SE BUSCA UN DEA Y EQUIPO DE EMERGENCIAS O SE PIDE A ALGUIEN QUE LO TRAIGA

4

INICIAR RCP

- REALIZAR CICLOS DE 30 COMPRESIONES Y 2 VENTILACIONES
- UTILIZAR EL DEA TAN PRONTO COMO ESTE DISPONIBLE

5

EL DEA LLEGA

7

ADMINISTRAR 1 DESCARGA. REANUDAR LA RCP DE INMEDIATO DURANTE 2 MINUTOS (HASTA QUE LO INDIQUE EL DEA PARA PERMITIR LA COMPROBACION DEL RITMO. CONTINUAR HASTA QUE LO SUSTITUYAN LOS PROFESIONALES DE SOPORTE VITAL AVANZADO O LA VICTIMA COMIENCE A MOVERSE

6

COMPROBAR EL RITMO ¿EL RITMO ES DESFIBRILABLE?

8

- REANUDAR LA RCP DE INMEDIATO DURANTE 2 MINUTOS (HASTA QUE LO INDIQUE EL DEA PARA PERMITIR LA COMPROBACION DEL RITMO
- CONTINUAR HASTA QUE LO SUSTITUYAN LOS PROFESIONALES DEL SOPORTE VITAL AVANZADO O LA VICTIMA COMIENCE A MOVERSE.

SI, ES DESFIBRILABLE

NO, NO ES DESFIBRILABLE