



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Ana Karen Tolentino Martínez

Nombre del tema: RCP Básica

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Enfermería clínica II

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello

Galvez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 5

RCP BÁSICA

ALGORITMO

Conformar seguridad de la escena

- Comprobar si la víctima responde
- pedir ayuda en voz alta a las personas que estén cerca
- llamar a emergencias
- Pedir un DEA

Comprobar si la víctima tiene pulso y respiración o solo jadea/boquea

Respiración normal, se detecta pulso

- Controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia

Respiración anormal, no se detecta pulso

- Proporcionar ventilación, cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto
- Comprobar pulso cada 2 minutos, si no hay, iniciar RCP

NO HAY RESPIRACIÓN, NO SE DETECTA PULSO

- Iniciar RCP
- Realizar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones
- Utilizar un DEA lo más pronto posible

EL DEA llega

Comprobar el ritmo

Si, si es desfibrilable

Administrar 1 descarga.
Reanudar la RCP inmediato durante 2 minutos
Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.

No, no es desfibrilable

- Reanudar la RCP de inmediato durante 2 minutos
- Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales del soporte vital

¿QUÉ ES?

Es una técnica de primeros auxilios que puede ayudar a mantener a alguien con vida en caso de accidente el tiempo suficiente para que llegue la ayuda de emergencia.

Sólo se recomienda que realices la RCP básica si se cumplen las tres condiciones siguientes.

- La respiración se ha detenido por completo.
- Tras tomar el pulso, no hay señales de circulación y no responde a estímulos físicos.
- Eres la persona más capacitada para realizar la reanimación cardiopulmonar.

Si aún está consciente, la maniobra de Heimlich es la mejor manera de liberar el bloqueo de la tráquea (tráquea), pero si la persona está inconsciente, se debe evitar este método.