



Nombre del Alumno: Vanessa Geraldin Flores de León

Nombre de la Materia: Enfermería clínica

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Galvez

Carrera: ENFERMERIA V

Confirmar la seguridad del paciente

2

- Comprobar si la víctima responde.
- Pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca.
- Activar sistema de respuesta a emergencias a través de un dispositivo móvil.
- Obtener un DEA y equipo para emergencia (o enviar a una persona por ello)

3a

LA RESPIRACION ES NORMAL , SE DETECTA PULSO.
Controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencia

3

Comprobar si la víctima no respira o solo jadea/boquea y coprobar el pulso (al mismo tiempo)

4

INICIAR RCP

- Realizar ciclos de 30 compresiones y cada 2 ventilaciones.
- Utilizar el DEA tan pronto como este disponible.

3b

- LA RESPIRACION ES ANORMAL; SE DETECTA PULSO.
- Proporcionar ventilaciones de rescate: realizar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto.
 - Comprobar el pulso cada 2 minutos., si no hay pulso, se deberá iniciar RCP.
 - Si se sospecha de presencia de sobredosis de opiáceos, administra naloxona si disponible.

5

EL DEA LLEGA

7

SI, ES DESFRIBILANBLE

- Administrar 1 descarga. Reanudar la RCP de inmediato durante 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo)
- Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.

6

Comprobar el ritmo.
¿El ritmo es desfibrilable?

8

NO, NO ES DESFRIBILABLE.

- Administrar 1 descarga. Reanudar la RCP de inmediato durante 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo)
- Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.