



## Mapa conceptual

*Nombre del Alumno: Esmeralda yeraldi López morales*

*Nombre del tema: “RCP Básica”*

*Parcial: Segundo parcial*

*Nombre de la Materia: Enfermería Clínica II*

*Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Galvez*

*Nombre de la Licenciatura: Licenciatura de enfermería*

*Cuatrimestre: Quinto cuatrimestre*

# "RCP Básica"

Confirmar la seguridad de la escena

- Comprobar si la víctima responde
- Pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca.
- Activar el sistema de respuesta emergencias a través de un dispositivo móvil
- Obtener un DEA y equipo para emergencias.

Comprobar si la víctima no respira o solo jadea/boqueo y comprobar el pulso (al mismo tiempo). ¿Se detecta pulso con certeza al cabo de 10 segundos?



En este punto, en todos los escenarios, se activa el sistema de respuesta a emergencia o la asistencia y se busca un DEA y equipo de emergencia o se pide a alguien que lo traiga.

**Iniciar RCP**

- Realizar ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones.
- Utilizar el DEA tan pronto como esté disponible.

El DEA llega.

Comprobar el ritmo. ¿El ritmo es desfibrilable?

Sí, es desfibrilable

No, no es desfibrilable

(A) La respiración es normal; se detecta

Controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencias.



(B) La respiración es anormal; se detecta pulso

- Proporcionar ventilación de rescate: realizar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto.
- Comprobar el pulso cada 2 minutos: si no hay pulso, se debe iniciar la RCP.
- Si se sospecha la presencia de sobredosis de opiáceos, administrar naloxona si está disponible siguiendo el protocolo.

- Administrar 1 descarga. Reanudar la RCP de inmediato durante 2 minutos. (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo)
- Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.

- Reanudar la RCP de inmediato durante 2 minutos (hasta que lo indique el DEA para permitir la comprobación del ritmo).
- Continuar hasta que lo sustituyan los profesionales de soporte vital avanzado o la víctima comience a moverse.