



NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE: Marcos Jodhany Arguello Galvez

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO: Yuridia Aguilar Montero

CUATRIMESTRE: 5to

PARCIAL: 2do

MATERIA: Enfermeria Clinica II

TRABAJO: Mapa Conceptual

RCP BASICO



CONFIRMAR LA SEGURIDAD DE LA ESCENA

- COMPROBAR SI LA VICTIMA RESPONDE
- PEDIR AYUDA EN VOZ ALTA A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN CERCA
- ACTIVAR EL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS A TRAVES DE UN DISPOSITIVO MOVIL (SI ES POSIBLE)
- OBTENER UN DEA Y EQUIPO PARA EMERGENCIA O ENVIAR A OTRA PERSONA QUE LO TRAIGA

LA RESPIRACION ES NORMAL; SE DETECTA PULSO

CONTROLAR HASTA QUE LLEGUEN REANIMADORES DE EMERGENCIA

COMPROBAR SI LA VICTIMA NO RESPIRA O SOLO JADEA/BOQUEA Y COMPROBAR EL PULSO AL MISMO TIEMPO. ¿SE DETECTA PULSO CON CERTEZA AL CABO DE 10 SEGUNDOS?

LA RESPIRACION ES ANORMAL; SE DETECTA PULSO

PROPORCIONAR VENTILACION DE RESCATE: REALIZAR UNA VENTILACION CADA 6 SEGUNDOS O 10 VENTILACIONES POR MINUTO
COMPROBAR EL PULSO CADA 2 MINUTOS SI NO HAY PULSO, SE DEBE INICIAR RCP
SI SE SOSPECHA LA PRESENCIA DE SOBREDOSIS DE OPIACES ADMINISTRAR NALOXONA SI ESTA DISPONIBLE SIGUIENDO EL PROTOCOLO

En este punto, en todos los escenarios se activa el sistema de respuesta a emergencias o la asistencia y se busca un DEA y equipo de emergencias o se pide a alguien que lo traiga

INICIAR RCP

- REALIZAR CICLOS DE 30 COMPRESIONES Y 2 VENTILACIONES
- UTILIZAR DEA TAN PRONTO COMO ESTE DISPONIBLE

No hay respiraciones o solo hay jadeos/boqueos: no se detecta pulso



EL DEA LLEGA

COMPROBAR EL RITMO
¿EL RITMO ES DESFIBRABLE?



Si, es desfibrilable

- ADMINISTRA 1 DESCARGA. REANUDAR LA RCP DE INMEDIATO DURANTE 2 MINUTOS HASTA QUE LO SUBSTITUYAN LOS PROFESIONALES DE SOPORTE VITAL AVANZADO O LA VICTIMA COMIENCE A MOVERSE

No, no es desfibrilable

- REANUDAR RCP DE INMEDIATO DURANTE 2 MINUTOS HASTA QUE LO INDIQUE EL DEA PARA PERMITIR LA COMPROBACION DEL RITMO
- CONTINUAR HASTA QUE LOS SUBSTITUYAN LOS PROFESIONALES DE SOPORTE VITAL AVANZADO O LA VICTIMA COMIENCE A MOVERSE