



Nombre del Alumno: Gretel Shadia Escriba Pérez

Nombre del tema: Colectectomía abierta y colectectomía laproscópica

Parcial: 3 ro

Nombre de la Materia: Enfermería Médico Quirúrgica I

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernandez

Nombre de la Licenciatura: Lic. en Enfermería

Cuatrimestre: 5 to

Colecistectomía abierta

Qué es?

La colecistectomía es la intervención quirúrgica consistente en la extracción de la vesícula biliar y es el método más común para tratar distintas patologías de este órgano.

Porque se realiza el procedimiento

Puede necesitar esta cirugía si tiene dolor u otros síntomas a raíz de los cálculos biliares. También puede necesitar la cirugía si su vesícula biliar no está funcionando normalmente.

Procedimiento

El cirujano hace una incisión de 6 pulgadas en el abdomen, debajo de las costillas del lado derecho.

Se retraen los músculos y tejidos para ver el hígado y la vesícula.

El cirujano extrae la vesícula.

Se cierra la incisión con grapas o suturas.

Se puede colocar un drenaje que va desde el interior hacia el exterior del abdomen.

El paciente es trasladado a un área de recuperación.

Duración

La colecistectomía abierta dura entre 1 y 2 horas.

Anestesia

Se requiere anestesia general.

Indicaciones

Se realiza cuando la vesícula biliar padece enfermedades como cálculos biliares, inflamación por infección, dolor abdominal intenso, entre otros.

Contraindicaciones

Trastornos fisiológicos graves o enfermedades cardiopulmonares que impidan la anestesia general.

Colecistectomía laparoscópica

Qué es?

es una cirugía que extrae la vesícula biliar a través de pequeñas incisiones en el abdomen. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se considera el estándar de oro para tratar cálculos biliares.

Porque se realiza el procedimiento

Usted puede necesitar esta cirugía si tiene dolor u otros síntomas a raíz de los cálculos biliares. También la puede necesitar si su vesícula biliar no está funcionando normalmente.

Procedimiento

1. El cirujano realiza 3 o 4 incisiones pequeñas en el abdomen.
2.
 - Se introduce un laparoscopio a través de una de las incisiones.
 - Se introducen otros instrumentos médicos a través de los otros cortes.
 - Se bombea gas dentro del abdomen para expandir el espacio.
 - El cirujano ve dentro del abdomen y extirpa la vesícula biliar.

Indicaciones

La colecistectomía laparoscópica se recomienda para tratar: Cálculos biliares (colecistitis), Inflamación por infección (colecistitis), Dolor abdominal intenso debido a un cólico de vesícula.

Complicaciones

Las complicaciones más frecuentes son:

- Vómitos persistentes
- Insuflación extra peritoneal
- Dolor abdominal
- Hemorragia transquirúrgica
- Fuga biliar
- Lesión de los conductos