EUDS Mi Universidad

Nombre del alumno: Gretel Shadia Escriboi Pérez Nombre del tema: Principales entermedades infecto transmicible.

Nombre de la materia: patología del niño y adolescente.

Nombre de la maestra: Karla Jaqueline Flores Aguilar.

Nombre de la licenciatura: Lic. En enfermeria.

Parcial: 1 parcial

Cuatrimestre: 5 cuatrimestre.

Ajustar

INTRODUCCIÓN


La tos ferina es una infección bacteriana altamente contagiosa ya que afector al aparato respiratorio, esta se caracteriza por ataques severos de tos que pueden dificultar la respiración.

El tétanos, esta enfermedad se encuentra comunmente en el suelo y en objetos punzantes, provoca rigidez muscular y espasmos ya que olicha enfermedad puede ser mortal si no se trata a tiempo.

La poliomielitis esta enfermedad es viral ya que puede causar paralisis y en casos severos la muerte. La vacuna contra esta enfermedad ha sido la clave en la reducción de casos a nivel mundial, y se trabaja para erradicarla por completo.

Sarampeón: esta enfermedad es viral y muy contagiosa que se manificata con fiebre, alta, tos y una erupción característica en la piel. La vacunación en la mejor forma de prevenir el sarampaón y ha demostrado ser muy efectivos.

Te hablaremos sobre estas enfermedades en como se transmite, su digignostico y como poder prevenirla.



TIPOS EUIGAGG DE COMO SE TEATAMENTO! PREVENCIÓN MINTONAS COMBLICACIONES ETIOLOGIA TISTO PATOLOGIA ENTERMERIA Ocaciona con-Es una entermedad Clostridium Tetano Acción de la toretano · Problemas res-SU Unica Forma Meonatal No vacura-· DelaJantes tracciones musneona tal localizado Incluyen. aguda y grave piratorios, pueden tetani xina tetanica. de prevenir es musculares culares + ser mortales. mediante la suele estar como el diase caracte-· Vacunar a Fradricias de A través de on Vacunación. · Mantener la herida asociada zepam. tiza parescomo Causada hoesos, como todas las con las praccubierta con un apocorte o de una Angerobio, Pasmos mis-Mantener una la columna verte Esta ticas de parmujeres · Musculos del sito hasta que se reproductor de colares en berida profunda. Ventilación o como to y del corbral. emb arazadas el áreo de forme una costra. esporas. cuello. don umbilical Coaquiación de adecvada. Asequrar un Por la bacteria la herida. Mandibula · Limpiar la herida no esteriles. alumbramiento (TTCV) se Bloquea las selos vasos san-Que anaerobica gram Reposo en · Abdomen. con aguo y Jabón, quineos. debe aplicar de en condiciones Esta Positiva. rale nerviosas cama en un Yapliar unquento 50n Sanitarias adeeor ulda. Daños cerebrales Se contamina ambiente calantibiotico. que van de la me-Tetano cecausa wadas con el organismo Suele ser mado. · Cambiar el apósito · Ritmo cardiaco dula espiral a falico. Mantener la menos gra-A fecta anormal. Por la menas una vez succeptibles los musculos. we. Impedir la higiene del Nacuna Td al dia o cuando se · Rigidez Coma. se asocia cordon umbilical al calor y Se caracteriza liberación de mandibular moje o se ensucie. gran contidad por la paralisis mas toxina. general andos · Dificultad Para Provoca · Administrar Immuno-A todos los grupos como de uno o más de desinfecpara deglutir globulling antitetà nervios crane de edad en partir · Rigidez del nica para neutralizar tantes. Entermedad ales y trismo. · Niños moyores · Umpieza de Hediante Espasmos intera los recien nacidos wello, brazes la toxina. infecciosa de 7 años. heridas. y pierna. soo r rigidez. que se carac · Inmunizar al paciente Y Jovenes · Adolescentes Procedimientos teriza por · babeo, sudo-4 fecta con toxoide tetanico. El desbriración exce-· Adultos. quirurgicos. espasmos mus · Administrar antibioculares genedamiento de Infecciones siva y fiebre nervios ticos, como metroralizados. dentales la herida. · Espaismos de Refuerzo codo hidazol o penicilira presenta craneales Uso de drogas la mano o 10 años . intravenosas. Const

MANAGERICA mentance NOW A BUILDING NAMARA polio Diseminación se transmite perpoliomierase de inte se previene Paralisis Inflamatorio en el cuerpo Es una entermedad Virus ARN de NO presentan 11100. oción inicial de persona a per con la vacuna no esteroide. Causada por el cadena positio Afecto 4 Incluyen Sintomas. graves Afecta antipoliomie-Afecto + Sona. sin cubierta. causa. Poliovirus. + litica. Entra al cuerto Los nervios 4 POT Analgesicos. A la medupor la boca, Graneales. pueden sufrir · brozos la espiral, enebilidad · 20000 Familia CUNIVIS la intección es En quienes piernas o atraviesa bo moscolar. Feal - oral. · Analgesicos ambos. asintomatica o se barrera locaprovoca . Debilidad mos-· Fatiga y antipireticos leve. 500 Picornaviridae. les y entra 4 colar. · Dolor cro-Replica end En niños antes La paralisis al torrente · Asistencia trovés Paralisis · perdida de mis nico. tesido infoide de complir los samuineo. Paralisis de respiratoria mede los musculos en los mus-· malnutrieulo. muade de la faringe y tracto intesasimetrico3 Es altamente s años de cánica. culos que · Atrofia respiratorios ción. con afectoinfeccioso y se controlon edad. Causando puede serfald. · Limpieza pulmo · Fatiga ción funda-Lina. · osteoporo-· Alimentos o inactiva facilmente la deglumental. nar. Al sistema nervi 515. · Sensacion de tación. agua contami-· Voloración de Viremia. oso central. nados con desmayo. · Transforms La paralisis No presenta Je da Por la capacidad de beces de per-· Cefalea. Causa wede durar del sueño Factores ambiensonas intectarealizar activi toda la vida. · Neumonia. tales como la luz Puede aldas. dades de alimen De persona Causa Sintomas Contacto con se da canzar órga-· Dificollad ultravioleta, el tación, baño. a persond, significatives nos secuncalor y desinfectories para trapar Superficies conevacuación y Vesdarlos. addh . taminados. timenta. A ninos que Paralisis y la nasal · la saliva de · Valoración del parecen recumuerte Resentorio · Disnea ona persona grado de adas Perarse por infectada a tación a la · Paralisis completo 40 través de la faringea. discapacidad que pueden Es el ser humano tos o los Fisico. Presentar doestanudos. y no existe porlores muscu-

