



UDSA

Mi Universidad

NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE: Maria del Carmen  
Lopez Silba

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO: Yuridia Aguilar  
Montero

CUATRIMESTRE: 5to

PARCIAL: 3er

MATERIA: Ginecología y Obstetricia

TRABAJO: Cuadro Sinóptico



# EVALUACION

## PATOLOGIAS MAS RARAS DEL NIÑO



### CONCEPTO

La placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta son dos condiciones diferentes que afectan la placenta durante el embarazo y pueden tener consecuencias significativas para la madre y el feto

#### CUIDADOS

- Mantenga la presión arterial alta, las enfermedades del corazón y la diabetes bajo control
- No consuma tabaco, alcohol o cocaína
- Siga las instrucciones de su proveedor acerca de cómo disminuir su riesgo si tuvo un desprendimiento de placenta en un embarazo anterior

### PLACENTA PREVIA

La placenta previa es una condición en la cual la placenta se implanta en la parte inferior del útero y cubre parcial o completamente el cuello uterino. Esto puede causar problemas durante el trabajo de parto y el parto


- 1. Placenta Previa Total: La placenta cubre completamente el cuello uterino.
- 2. Placenta Previa Parcial: La placenta cubre parcialmente el cuello uterino.
- 3. Placenta Marginal: La placenta está cerca del borde del cuello uterino.

### SINTOMAS

- Sangrado vaginal sin dolor, que puede ser leve o grave.
- Puede ocurrir en cualquier momento después de la semana 20 de embarazo

#### MANEJO

- Reposo y restricción de actividad
- Hospitalización en casos graves
- Motorización cercana y posiblemente cesarea



# PLACENTA PREVIA

## DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE LA PLACENTA NORMOINCERTA

### DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINCERTA

El desprendimiento prematuro de placenta es cuando la placenta se desprende del útero antes de que termine el trabajo de parto

### DIFERENCIAS CLAVE

**UBICACION DE PLACENTA:**  
En la placenta previa, la placenta está mal ubicada y puede cubrir el cuello uterino



#### SINTOMAS:

- Dolor abdominal intenso y continuo
- Sangrado vaginal
- Contracciones uterinas

#### MANEJO:

- Requieren atención inmediata
- Monitorización fetal
- Reposo y en algunos casos, entrega inmediata del bebé por cesarea si hay signos de sufrimiento

#### SINTOMAS:

- La placenta previa se presenta con sangrado vaginal sin dolor.
- El desprendimiento prematuro de placenta normoincorta se presenta con dolor abdominal intenso, sangrado y contracciones.

#### MANEJO:

- El manejo de la placenta previa puede implicar reposo, monitorización y, en casos graves, cesarea.
- El desprendimiento prematuro de placenta normoincorta generalmente requiere atención médica urgente, y el tratamiento puede incluir la entrega inmediata del bebé, ya sea por parto vaginal o cesárea, dependiendo de la gravedad de la situación.

# **REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:**

**UDS.ANTOLOGIA.2025**