



Nombre del Alumno: Gretel Shadia Escriba Pérez

Nombre del tema: Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoinsera

Parcial: 3 ro

Nombre de la Materia: Ginecológica y obstetricia

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba

Nombre de la Licenciatura: Lic. en Enfermería

Cuatrimestre: 5 to

# Placenta previa

La placenta previa es un trastorno que se produce durante el embarazo en el que la placenta cubre total o parcialmente la abertura del útero (cuello del útero).

## ¿Qué es?

La placenta es un órgano materno-fetal que se desarrolla durante el embarazo. Esta estructura se encuentra en el útero

## Se encarga de:

suplir las necesidades básicas del feto a través de la madre: la respiración, la alimentación y la excreción.

## Placenta previa

Se produce cuando ésta crece en la parte más baja del útero y cubre toda la abertura del cuello uterino o parte de ella.



## Tipos

Placenta de inserción baja

Placenta previa marginal

Placenta previa parcial

Placenta previa total

• la placenta se encuentra en el segmento inferior del útero pero no alcanza la abertura del cuello uterino.



• la placenta está al lado del cuello uterino pero no cubre la abertura.



• la placenta cubre parte de la abertura cervical.



• la placenta cubre toda la abertura cervical. Este tipo también es conocido como placenta previa oclusiva.



## Causas de la placenta

La causa exacta de la placenta previa es desconocida. Lo más común es pensar que esta anomalía en la placenta está relacionada con causas uterinas o por alteraciones en la propia placenta.

## Factores de riesgo

- Malformaciones uterinas
- Embarazo gemelar o embarazo múltiple
- Haber tenido varios embarazos previamente
- Poco tiempo entre dos partos
- Haber tenido un parto previo por cesárea
- Cicatrices uterinas por abortos o cirugías previas
- Edad materna avanzada
- Tabaco y abuso de cocaína

## Ejemplos



# Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

## ¿Qué es?

El desprendimiento prematuro de placenta es un problema durante el embarazo en el que la placenta se separa de la pared del útero en forma muy temprana.

## durante el embarazo normal

- La placenta se mantiene firmemente adherida a la pared interna del útero hasta que el bebé haya nacido.



## Desprendimiento prematuro

- La placenta se separa (se desprende) de la pared del útero demasiado temprano, antes del nacimiento del bebé.

## causa del desprendimiento

### factores de riesgo comunes

- **Presión arterial alta.** Este es el mayor factor de riesgo para el desprendimiento prematuro de placenta, tanto si la presión arterial alta es un problema crónico o si está causada por el embarazo (**preeclampsia**).
- Haber tenido un desprendimiento prematuro de la placenta en el pasado.
- Fumar durante el embarazo.



### factores de riesgo más comunes

- Consumir cocaína.
- Tener una cicatriz de una cirugía anterior o un fibroma uterino donde la placenta se ha adherido a la pared del útero.
- Tener una lesión en el útero. Esto podría suceder a causa de un accidente automovilístico, una caída o maltrato físico.
- Ruptura prematura de las membranas por 24 horas o más, especialmente cuando hay una infección en el útero.



## sintomas

No se puede decir realmente cuál es la gravedad del desprendimiento prematuro de placenta por la cantidad de sangrado vaginal. A veces, la sangre queda atrapada entre la placenta y la pared del útero

## señales de advertencia

- Tiene sangrado vaginal leve o moderado.
- Tiene dolor o molestias en el útero. También es posible que lo sienta duro o rígido.
- Tiene señales de trabajo de parto prematuro. Estas señales incluyen contracciones regulares y molestias o dolores en la parte baja de la espalda o en el abdomen.
- Nota que su bebé se mueve menos de lo habitual.



## Servicio de emergencia de inmediatos

- Dolor repentino o intenso en el abdomen.
- Sangrado vaginal intenso, como un chorro de sangre o la expulsión de un coágulo.
- Cualquier síntoma de choque ("shock"). Estos incluyen sentirse aturdida o como si usted estuviera por desmayarse. Sentirse confusa, inquieta o débil. Tener revoltura estomacal o vómito. Y tener respiración rápida y superficial.




# Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

## Cómo se diagnostica

El problema puede ser difícil de diagnosticar.

### pruebas que se realizan

- Una **cardiotocografía**. Esto se hace para evaluar la condición de su bebé y verificar si hay contracciones en el útero.
- Una **ecografía**. Esta prueba puede detectar aproximadamente la mitad de las abrupciones placentarias.
- Un **análisis de sangre** para ver si tiene anemia. Usted puede volverse anémica a causa de una pérdida de sangre intensa.



## Cómo se trata

### El tipo de tratamiento que necesite depende de:

- Cuán grave es el desprendimiento.
- Cómo está afectando a su bebé.
- Cuán cerca está de su fecha probable de parto.



### desprendimiento de placenta leve

- Usted y su bebé serán examinados con frecuencia durante el resto de su embarazo.
- Si usted está en trabajo de parto prematuro y está lejos de la fecha del parto, es posible que se le administren medicamentos para detener el trabajo de parto.



### desprendimiento moderado grave

- En la mayoría de los casos, será necesario dar a luz al bebé rápidamente. Esto significa que es probable que a usted le realicen una **cesárea (parto por cesárea)**.
- Si ha perdido mucha sangre, es posible que necesite una transfusión.



# CONCLUSIÓN

La placenta previa es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna. Todos los hospitales deben contar con un protocolo o algoritmo para el manejo de la placenta previa. Los factores de riesgo de morbilidad materna incluyen placenta previa completa, antecedentes de cesárea previa, cesárea de emergencia a una edad gestacional de <36 semanas y pérdida de sangre estimada >2000 ml. Placenta previa se define como una condición que ocurre en el embarazo cuando la placenta se implanta anormalmente en el segmento uterino inferior, cubriendo parcial o totalmente el orificio cervical interno. La placenta previa completa es cuando cubre el orificio cervical interno, parcial es cuando la placenta cubre parcialmente el orificio y marginal es cuando la placenta se acerca al borde del orificio.

El desprendimiento prematuro de la placenta es la separación de la placenta normalmente situada antes del parto del feto. Puede ser oculto o manifiesto. En general se presenta como un sangrado vaginal asociado con dolor abdominal y contracciones en la segunda mitad del embarazo. Asociado con un aumento en la mortalidad y la morbilidad perinatales. También representa una causa de morbilidad materna significativa

# BIBLIOGRAFÍA

<https://bestpractice.bmj.com/topics/es-es/1117>

<https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/placenta-previa/symptoms-causes/syc-20352768>

<https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/complicaciones-del-embarazo/desprendimiento-de-placenta-abruptio-placentae>