



NOMBRE DEL ALUMNO: KARLA JULISSA MORALES  
MORENO

NOMBRE DEL TEMA: VALORACION DEL RECIEN NACIDO  
PARCIAL: 2

NOMBRE DE LA MATERIA: CUIDADOS DEL NIÑO Y  
ADOLESCENTE

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA DEL CARMEN LOPEZ  
SILBA

NOMBRE DE LA LICENCIATURA: ENFERMERIA  
CUATRIMESTRE: 5TO

# VALORACION DEL R/N

La valoración del recién nacido es un proceso integral que se lleva a cabo por los profesionales de la salud para evaluar el estado de salud y bienestar del bebé en sus primeros minutos, horas o días de vida. Esta evaluación es fundamental ya que permite detectar posibles problemas o complicaciones que puedan afectar la salud del recién nacido.

La valoración del recién nacido es esencial en el ámbito de los profesionales de la salud por varias razones:

1. Identificación temprana de problemas de salud
2. Evaluación del estado general del recién nacido
3. Prevención de complicaciones
4. Establecimiento de planes de cuidado adecuados



## SILVERMAN

La Valoración de Silverman es una herramienta utilizada para evaluar el estado respiratorio del recién nacido. Se utiliza especialmente en bebés prematuros o que pueden tener dificultades respiratorias. La escala considera diferentes aspectos relacionados con la respiración y proporciona una puntuación que ayuda a determinar la gravedad de la situación.

☒ Retracción Intercostal: Observación de retracción entre las costillas durante la respiración. ☒ Quejido Audible: Evaluación de la presencia de sonidos quejumbrosos durante la respiración. ☒ Quejido Al Respirar: Observación de quejido durante la inspiración o la espiración. ☒ Postura: Evaluación de la postura y la posición del bebé durante la respiración. ☒ Cianosis: Observación de cualquier cambio en el color de la piel debido a la falta de oxígeno.

## Escala de Silverman

*Studies.cah*

Signos clínicos	0 puntos	1 punto	2 puntos
Disociación toracoabdominal	Expansión coordinada	Hundimiento torax/abdomen	Disociancia
Tiraje intercostal	Ausente	Débil	Marcado
Retracción esternal	Ausente	Ligeramente visible	Marcado
Aleteo nasal	Ausente	Mínimo	Marcado
Quejido respiratorio	Ausente	Audible con estetoscopio	Audible a distancia

*@studies.cah*

## APGAR

La Escala de Apgar es una herramienta más ampliamente utilizada y evalúa cinco criterios diferentes para proporcionar una puntuación global del bienestar del recién nacido. La escala se aplica a los 1 y 5 minutos después del nacimiento, y los cinco criterios evaluados se recuerdan con el acrónimo APGAR: ☒ Apariencia (Color de la Piel) ☒ Pulso (Frecuencia Cardíaca) ☒ Grimace (Reflejos del Bebé) ☒ Activity (Tono Muscular) ☒ Respiration (Respiración)

## ESCALA DE APGAR

valoración del recién nacido tras el parto

A	P	G	A	R
apariencia	pulso	gestos	actividad	respiración
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
COLOR	FRECUENCIA CARDÍACA	REFLEJOS	TONO MUSCULAR	ESFUERZO RESPIRATORIO

La evaluación de Apgar puede realizarse junto a la madre durante el primer minuto de vida del recién nacido. Si la evaluación es mayor a 7, el neonato puede seguir con ella acompañado de un sanitario hasta la valoración de los 5 minutos; si es menor se debe trasladar al bebé a una zona de atención y estabilización.

SATISFACTORIO **7-10**  
 DIFICULTAD MODERADA **4-6**  
 DIFICULTAD MARCADA **0-3**

AEPEP, Asociación Española de Pediatría



# CAPURRO

En neonatología, la valoración o test de Capurro (o método de Capurro) es un criterio utilizado para estimar la edad gestacional de un neonato. El test considera el desarrollo de cinco parámetros fisiológicos y diversas puntuaciones que combinadas dan la estimación buscada. Este método fue obtenido mediante un estudio protocolizado y prospectivo basado en el trabajo de Dubowitz y tiene dos formas de evaluación: A y B. La edad gestacional es la forma de juzgar la madurez y tamaño de un recién nacido.

Esta determinación tiene el propósito de anticipar riesgos médicos, prevenir complicaciones y distinguir capacidades de cada niño de acuerdo a su desarrollo, como alimentarse o estipular necesidades de su cuidado.


Este método nos sirve para determinar la edad gestacional

### CAPURRO

Forma de la OREJA (Pabellón)	Tamaño de GLÁNDULA MAMARIA	Formación del PEZÓN	TEXTURA de la PIEL	PLEGUES PLANTARES
0: Ausencia de pabellón	0: No palpable	0: Ausencia de pezón	0: Muy fina gelatinosa	0: Sin pliegues
5: Bunde superior parcialmente desarrollado	5: Pabellón rudimentario de 5 a 8 mm	5: Ausencia de pezón	5: Fina lisa	5: Manchas muy profundas en la mitad anterior
10: Bunde superior totalmente desarrollado	10: Pabellón rudimentario de 9 a 11 mm	10: Ausencia de pezón	10: Más gruesa directa de coloración superficial	10: Manchas bien profundas en la mitad anterior
15: Pabellón totalmente desarrollado	15: Pabellón rudimentario de 12 a 14 mm	15: Ausencia de pezón	15: Gruesa grisácea superficial de coloración de mancha	15: Manchas en la mitad anterior
20: Pabellón totalmente desarrollado	20: Pabellón rudimentario de 15 a 17 mm	20: Ausencia de pezón	20: Gruesa grisácea profunda de coloración de mancha	20: Manchas en más de la mitad anterior

Postmaduro 42 Semanas o más  
A término 37 a 41 semana  
Prematuro Leve 35 a 36 semana  
Prematuro Moderado 32 a 34 semana  
Prematuro Extremo < 32 semana

Se suman los valores dados por cada parámetro de la tabla. A esto denominaremos puntaje parcial. Luego se aplica la siguiente fórmula:  
**204 + Puntaje parcial**



## CONCLUSION

La realización de esta guía del recién nacido basada en evidencia es una respuesta eficiente y adecuada a la problemática planteada en las preguntas analizadas.

El proveedor de atención médica revisará la madurez de su bebé, es una parte muy importante de su cuidado, esta evaluación ayuda a determinar el tipo necesario de cuidados para el bebé, si no se conoce con exactitud las fechas de un embarazo. Inmediatamente después del parto es preciso evaluar el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el color, el entorno y la actividad refleja del recién nacido.

## BIBLIOGRAFIA

- ANTOLOGIA DE LA MATERIA
- [yoamoenfermeriablog.com/capurro](http://yoamoenfermeriablog.com/capurro)

