



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Esmeralda yeraldi López morales

Nombre del tema: Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoincorta.

Parcial: Tercer parcial

Nombre de la Materia: Ginecología Y Obstetricia

Nombre del profesor: María del Carmen López silba

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: Quinto cuatrimestre

7 de marzo del 2025

Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoincorta.

La placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta son dos condiciones diferentes que afectan la placenta durante el embarazo y pueden tener consecuencias significativas para la madre y el feto.

Placenta Previa

La placenta previa es una condición en la cual la placenta se implanta en la parte inferior del útero y cubre parcial o completamente el cuello uterino, esto puede causar problemas durante el trabajo de parto y el parto



clasificación

- Placenta Previa Total: La placenta cubre completamente el cuello uterino.
- Placenta Previa Parcial: La placenta cubre parcialmente el cuello uterino.
- Placenta Marginal: La placenta está cerca del borde del cuello uterino.



Síntomas

- Sangrado vaginal sin dolor, que puede ser leve o grave.
- Puede ocurrir en cualquier momento después de la semana 20 de embarazo



Manejo

- Reposo y restricción de actividad.
- Hospitalización en casos graves.
- Monitorización cercana y posiblemente cesárea si el sangrado es significativo o si hay riesgo para la madre o el feto.



Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoincorta.

La placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta son dos condiciones diferentes que afectan la placenta durante el embarazo y pueden tener consecuencias significativas para la madre y el feto.

Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoincorta

El desprendimiento prematuro de placenta es cuando la placenta se desprende del útero antes de que termine el trabajo de parto.

Se clasifica como normoincorta si la sangre se acumula detrás de la placenta que está todavía en su lugar



Síntomas

- Dolor abdominal intenso y continuo
- Sangrado vaginal
- Contracciones uterinas



Manejo

- Requiere atención médica inmediata.
- Monitorización fetal.
- Reposo y, en algunos casos, entrega inmediata del bebé por cesárea si hay signos de sufrimiento fetal o hemorragia grave.




Diferencias Clave

Ubicación de la Placenta:

- En la placenta previa, la placenta está mal ubicada y puede cubrir el cuello uterino.
- En el desprendimiento prematuro de placenta normoincorta, la placenta aún está adherida al útero, pero se ha producido un desprendimiento parcial o total prematuro.

VARIEDADES DE PLACENTA PREVIA



Síntomas

- La placenta previa se presenta con sangrado vaginal sin dolor.
- El desprendimiento prematuro de placenta normoincorta se presenta con dolor abdominal intenso, sangrado y contracciones.



Manejo

- El manejo de la placenta previa puede implicar reposo, monitorización y, en casos graves, cesárea.
- El desprendimiento prematuro de placenta normoincorta generalmente requiere atención médica urgente, y el tratamiento puede incluir la entrega inmediata del bebé, ya sea por parto vaginal o cesárea, dependiendo de la gravedad de la situación.



Conclusión

Como podemos ver la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta son complicaciones graves del embarazo por lo cual pueden poner en riesgo la vida de la madre y del feto, por la cual puede provocar un parto prematura que existen complicaciones como el sangrado vaginal intenso, las recomendaciones es que la madre tenga un reposo sin realizar ninguna actividad para su mejoramiento y su cuidado, en cazo que sea grave se realizara una cesaría para no poner en riesgo a la madre y su bebe, por eso es muy importante prevenir y controlar estas enfermedades del embarazo.

Bibliografía

UDS2024.GINECOLOGÍA

Y

OBSTETRICIA.URL.<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/0e4ac5d22581b8f435b8db4b04ebe378-LCLEN506%20GINECOLOGIA%20Y%20OBSTETRICIA%202024.pdf>