



NOMBRE DEL ALUMNO: Odalis Garcia Morales

NOMBRE DEL TEMA: Placenta previa

NOMBRE DE LA MATERIA Ginecologia

NOMBRE DEL PROFESOR : Lic. María del carmen Lopez silbas

NOMBRE DE LA LIC: Enfermeria

CUATRIMESTRE: 5 cuatri

Conclusión

La placenta previa y el DPP son condiciones

- que requieren una atención médica inmediata y adecuada. La placenta previa se caracteriza por la implantación anormal de la placenta en el útero, lo que puede causar sangrado
- vaginal durante el embarazo ◦ el parto.

El

, DPP, por otro lado, se caracteriza por la

- separación prematura de la placenta del útero, lo que puede causar sangrado vaginal, dolor abdominal y problemas para el bebé.

3.9. PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMALCERTA.

QUE ES

La placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta son dos condiciones diferentes que afectan la placenta durante el embarazo y pueden tener consecuencias significativas para la madre y el feto.



PLACENTA PREVIA

es una condición en la cual la placenta se implanta en la parte inferior del útero y cubre parcial o completamente el cuello uterino. Esto puede causar problemas durante el trabajo de parto y el parto.



PLACENTA PREVIA TOTAL

La placenta cubre completamente el cuello uterino.



PLACENTA PREVIA PARCIAL

- La placenta cubre parcialmente el cuello uterino.

PLACENTA MARGINAL

- La placenta está cerca del borde del cuello uterino.



SINTOMAS

Sangrado vaginal sin dolor, que puede ser leve o grave. □ Puede ocurrir en cualquier momento después de la semana 20 de embaraz

MANEJO

Requiere atención médica inmediata. □ Monitorización fetal. □ Reposo y, en algunos casos, entrega inmediata del bebé por cesárea si hay signos de sufrimiento fetal o hemorragia grave.



3.9. PLACENTA PREVIA Y DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA NORMOINCERTA.

DIFERENCIAS CLAVE

- Ubicación de la Placenta: □ En la placenta previa, la placenta está mal ubicada y puede cubrir el cuello uterino. UNIVERSIDAD DEL SURESTE 66 □ En el desprendimiento prematuro de placenta normoincerta, la placenta aún está adherida al útero, pero se ha producido un desprendimiento parcial o total prematuro.



SINTOMAS

La placenta previa se presenta con sangrado vaginal sin dolor. □ El desprendimiento prematuro de placenta normoincerta se presenta con dolor abdominal intenso, sangrado y contracciones.



MANEJO

El manejo de la placenta previa puede implicar reposo, monitorización y, en casos graves, cesarea. □ El desprendimiento prematuro de placenta normoincerta generalmente requiere atención médica urgente, y el tratamiento puede incluir la entrega inmediata del bebé, ya sea por parto vaginal o cesárea, dependiendo de la gravedad de la situación.



Bibliografía

Antología*UDS