



- ♥ **Nombre del Alumno.** *Karla Valeria Ramos Cancino*
- ♥ **Nombre del tema:** VALORACION DEL R/N
- ♥ **Parcial:** 2
- ♥ **Nombre del profesor:** *MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA*
- ♥ **Nombre de la Licenciatura:** GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Escala de Apgar (Valoración Inmediata del R/N)

Objetivo: Evaluar la vitalidad del recién nacido al minuto ya los 5 minutos de vida.



- ♥ Parámetros evaluados:
- ♥ Frecuencia cardíaca (0=ausente, 1=<100 lpm, 2=>100 lpm).
- ♥ Esfuerzo respiratorio (0=ausente, 1=lento/irregular, 2=llanto fuerte).
- ♥ Tono muscular (0=flácido, 1=flexión mínima, 2=movimientos activos).
- ♥ Respuesta a estímulos (0=sin respuesta, 1=gesticulación, 2=llanto, tos o estornudo).
- ♥ Coloración de la piel (0=cianosis/palidez, 1=acro cianosis, 2=rosado).

Interpretación:

- ♥ 0-3: Depresión severa (asfixia grave).
- ♥ 4-6: Depresión moderada.
- ♥ 7-10: Estado normal.



Escala de Silverman-Anderson (Valoración de la Dificultad Respiratoria)

+

Objetivo: Evaluar la dificultad respiratoria en el recién nacido.

Escala de Silverman

Parámetros evaluados:

- ♥ Movimiento toracoabdominal (0=sin retracción, 1=disociación leve, 2=disociación grave).
- ♥ Tiraje intercostal (0=ausente, 1=leve, 2=intenso).
- ♥ Retracción xifoidea (0=ausente, 1=leve, 2=intensa).
- ♥ Aleteo nasal (0=ausente, 1=leve, 2=intenso).
- ♥ Quejido espiratorio (0=ausente, 1=audible con estetoscopio, 2=audible a distancia).

Signos clínicos	0 puntos	1 punto	2 puntos
Disociación toracoabdominal	 Expansión coordinada	 Hundimiento tórax/abdomen	 Discordancia
Tiraje intercostal	 Ausente	 Débil	 Marcado
Retracción esternal	 Ausente	 Ligeramente visible	 Marcado
Aleteo nasal	 Ausente	 Mínimo	 Marcado
Quejido respiratorio	 Ausente	 Audible con estetoscopio	 Audible a distancia



Interpretación:

- ♥ 0 puntos: Sin dificultad respiratoria.
- ♥ 1-3 puntos: Dificultad nivel respiratorio.
- ♥ 4-6 puntos: dificultad moderada

Conclusión

Las escalas de Capurro, Apgar y Silverman son herramientas esenciales en la valoración del recién nacido, permitiendo evaluar su edad gestacional, adaptación a la vida extrauterina y función respiratoria.

Capurro estima la edad gestacional, lo que ayuda a clasificar al neonato como pretérmino, término o postérmino.

Apgar valora la vitalidad del recién nacido al minuto ya los 5 minutos de vida, determinando la necesidad de intervención médica inmediata.

Silverman evalúa la dificultad respiratoria, permitiendo una rápida identificación de problemas pulmonares y la instalación temprana de medidas terapéuticas.

El uso combinado de estas escalas permite una valoración integral del neonato, favoreciendo una atención rápida y efectiva para mejorar su pronóstico.

BIOGRAFIA:

UDS. Antología de GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.

PDF.2025.

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/0e4ac5d22581b8f435b8db4b04ebe378-LCLEN506%20GINECOLOGIA%20Y%20OBSTETRICIA%202024.pdf>.