

SUPERNOTA



Nombre del alumno: Leonardo Daniel
Morales Jonapá

Nombre del profesor: Aldrin De Jesús
Maldonado Velasco

Segundo cuatrimestre

Grado: 2° Grupo: B

Lic. en M.V.Z

Bioquímica I I




CASO CLINICO DEFICIENCIA EN LA REPLICACION DE ADN

CRIPTORQUIDIA CANINA



Se trata de la ausencia de uno o más testículos en la bolsa escrotal debido a que éstos no han descendido cuando lo normal es que lo hagan a las 8 semanas de vida.

TIPOS



Criptorquidia unilateral.

Criptorquidia bilateral.

Criptorquidia inguinal.

Criptorquidia abdominal.

DIAGNOSTICO



Se realiza de forma sencilla mediante la palpación, siendo definitivo a partir de los seis meses de edad.

CAUSAS



Aunque se cree que el componente genético resulta de gran importancia pues se trata de una enfermedad hereditaria que pueden transmitir tanto las hembras como los machos.

RAZAS QUE SUFREN DE ESTO



Boxer, Bichon maltes, Pequines, caniche, Teckel, Schnauzer miniatura, Yorkshire.

SINTOMAS



- El pene se encoge y su tamaño disminuye.**
- Las mamas se desarrollan.**
- El perro adopta una posición femenina para orinar.**

TRATAMIENTO



El tratamiento es quirúrgico y consiste en la extirpación de los testículos no descendidos.

PREVENCION



Únicamente se puede prevenir mediante la adecuada selección de los padres para la reproducción.

REFERENCIAS EN FORMATO APA:

**Arana, M. (2022, 16 mayo). Criptorquidia en perros - Tratamiento y síntomas. [expertoanimal.com](https://www.expertoanimal.com/criptorquidia-en-perros-tratamiento-y-sintomas-20382.html).
<https://www.expertoanimal.com/criptorquidia-en-perros-tratamiento-y-sintomas-20382.html>.**

(Logo de Mvz - Bing, s. f.)