Nombre de alumno: Eddy Antonio López Pérez

Nombre del profesor: samntha guillen polenz

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: pequeñas especies

Grado: 5

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de febrero de 2025

Parásitos en perros y gatos

Endoparásitos

– Viven dentro del organismo (intestino, corazón, pulmones, otros órganos).

– Se transmiten por ingestión, penetración cutánea o vía transplacentaria/lactogénica.

– Pueden causar enfermedades que afectan la nutrición, el sistema inmunitario y pueden

Nematodos (Gusanos redondos)

Toxocara canis (perros) / Toxocara cati (gatos)

* Ciclo: Los animales se infectan al ingerir huevos contaminados; en perros, también por transmisión transplacentaria o lactogénica.

* Consecuencias: Larva migran visceral u ocular en humanos (zoonosis).

Ancylostoma caninum / Uncinaria spp.

* Ciclo: Larvas presentes en el ambiente penetran la piel o se ingieren.

* Efectos: Anemia, irritación y daño intestinal.

Cestodos (Tenias)

Dipylidium caninum

* Ciclo: Transmisión al ingerir pulgas o piojos infectados (hospitales intermediarios).

* Signos: A menudo asintomáticos, pero pueden notarse segmentos en las heces.

Echinococcus granulosus / E. multilocularis

* Ciclo: Ingestión de huevos excretados por el hospedador definitivo (perros o zorros).

* Importancia: Causa hidatidosis/quística en humanos, enfermedad grave zoonótica.

Trematodos (Gusanos planos)

* Transmisión: Ingestión de quistes presentes en agua o alimentos contaminados.

* Efectos: Diarrea, malabsorción y malestar digestivo.

Ectoparásitos

– Se localizan en la piel, el pelaje o en el ambiente inmediato del animal.

– Se alimentan de sangre, descamaciones o materia orgánica.

Pulgas

* Ctenocephalides felis: La más común en perros y gatos.

* C. canis: Menos frecuente.

– Ciclo: La hembra deposita huevos sobre el animal; los huevos caen al ambiente donde se desarrollan larvas y pupas, dependiendo de la humedad.

– Consecuencias: Dermatitis alérgica, irritación, anemia en infestaciones masivas y transmisión de Dipylidium caninum.

Garrapatas

– Ciclo: De tres a cuatro estadios (huevo, larva, ninfa y adulto); cada etapa (excepto el huevo) se alimenta de un hospedador.

– Consecuencias: Pueden causar anemia, reacciones locales y transmitir múltiples patógenos.

Ácaros

Sarcoptes scabiei

*Causa sarna; genera prurito intenso y lesiones cutáneas.

*Es zoonótico

Notoedres cati / Demodex spp

Asociados a demodicosis; afectan tanto a perros como a gatos, provocando áreas de alopecia y dermatitis.