



Nombre de alumno: Sayuri Azucena Salinas Aguilar

Nombre del profesor: Samantha Guillen Pohlenz

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: Patología y Tecnicas Quirurgicas de Pequeñas Especies

Grado: 5

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de febrero de 2025

PARASITOS

Son

Ectoparásitos

Son

Pulgas

Síntomas: Picazón intensa, caída del pelo, irritación de la piel, suciedad de pulgas (manchas negras en el pelaje), anemia (en casos graves).

Transmisión: Contacto directo con animales infectados, ambientes contaminados.

Garrapata

Síntomas: Piel roja e irritada, hinchazón, picazón, parálisis (en casos raros), transmisión de enfermedades como la enfermedad de Lyme y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Transmisión: Contacto con ambientes infectados, pasto alto, matorrales o áreas boscosas.

Ácaros

Síntomas: Lesiones en la piel, pérdida de cabello, costras, picazón intensa, infecciones de oído (para ácaros del oído).

Transmisión: Contacto directo con animales infectados, ambientes contaminados.

Anquilostómidos

Síntomas: Diarrea, sangre en las heces, anemia, pérdida de peso, letargo, tos.

Transmisión: Ingestión de heces infectadas, penetración de larvas en la piel, ingestión de presas infectadas

Tenias (cestodos)

Síntomas: Pérdida de peso, diarrea, estreñimiento, vómitos, dolor abdominal, arrastre (en perros).

Transmisión: Ingestión de pulgas infectadas (para *Dipylidium caninum*), ingestión de presas infectadas (para *Taenia spp.*), ingestión de heces infectadas (para *Echinococcus spp.*)

Giardia

Síntomas: Diarrea, vómitos, pérdida de peso, gases, dolor abdominal.

Transmisión: Ingestión de agua o heces contaminadas

Coccidios

Síntomas: Diarrea, heces con sangre, pérdida de peso, deshidratación.

Transmisión: Ingestión de heces contaminadas.

Endoparasitos

Son

Gusanos redondos

Síntomas: Vómitos, diarrea, pérdida de peso, mal estado del pelaje, distensión abdominal, tos (en cachorros y gatitos).

Transmisión: Ingestión de heces infectadas, tierra contaminada o presas infectadas. Los cachorros y los gatitos pueden adquirir lombrices intestinales de sus madres a través de la placenta o la leche

Trichuris (gusanos látigo)

Síntomas: Diarrea, moco en las heces, pérdida de peso, anemia, prolapso rectal (en casos graves).

Transmisión: Ingestión de heces infectadas